

### Prospect: Informații pentru pacient

#### **Ibuprofen US Pharmacia 200 mg comprimate filmate** **Ibuprofen US Pharmacia 400 mg comprimate filmate**

ibuprofen

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este Ibuprofen US Pharmacia și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Ibuprofen US Pharmacia
3. Cum să luați Ibuprofen US Pharmacia
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Ibuprofen US Pharmacia
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Ibuprofen US Pharmacia și pentru ce se utilizează**

Un comprimat de Ibuprofen US Pharmacia conține 200 mg sau 400 mg de ibuprofen, care aparține grupului de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). Medicamentele ameliorează afecțiuni precum febra, durerea și edemul, acționând asupra cauzei acestora.

Medicamentul este destinat utilizării în următoarele cazuri:

- dureri de diverse cauze, ușoare până la moderate: dureri de cap, de exemplu migrene, dureri în zona sacrală, dureri dentare, după extracția unui dinte, nevralgie, dureri la nivelul articulațiilor și mușchilor, durere menstruală.
- febră în cursul gripei și răcelii.

Ibuprofen US Pharmacia este indicat la adulți și adolescenți cu vârsta de peste 12 ani și greutate corporală > 40 kg.

Medicamentul este destinat utilizării pe termen scurt. Medicul poate recomanda administrarea medicamentului în alte cazuri decât cele enumerate mai sus (și în unele boli cronice). Apoi pacientul trebuie să urmeze instrucțiunile medicului privind dozele și durata tratamentului.

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

## **2. Ce trebuie să știți înainte să luați Ibuprofen US Pharmacia**

### **Când să nu luați Ibuprofen US Pharmacia**

#### **Ibuprofen US Pharmacia nu trebuie utilizat la următorii pacienți:**

- dacă sunteți alergic la ibuprofen sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6),
- pacient care a prezentat anterior hipersensibilitate alergică (de exemplu, urticărie, rinită, angioedem sau astm bronșic), după utilizarea de acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS),
- cu ulcer gastric activ sau în trecut și (sau) ulcer sau hemoragie duodenală (două sau mai multe episoade distincte de ulcerare sau sângerări dovedite),
- cu istoric de sângerări gastrointestinale sau perforație, în legătură cu terapia anterioară cu AINS (vezi pct. „Atenționări și precauții”),
- cu insuficiență hepatică severă, insuficiență renală severă sau insuficiență cardiacă severă (vezi pct. „Atenționări și precauții”),
- în ultimul trimestru de sarcină (vezi pct. „Sarcina, alăptarea și fertilitatea”),
- cu diateză hemoragică.

### **Atenționări și precauții**

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Ibuprofen US Pharmacia dacă ați fost diagnosticat cu:

- lupus eritematos sistemic și boala mixtă a țesutului conjunctiv,
- boli gastrointestinale și boli inflamatorii cronice intestinale (colită ulceroasă, boala Crohn),
- hipertensiune arterială și (sau) disfuncție cardiacă,
- insuficiență renală,
- tulburări hepatice,
- tulburări de coagulare (ibuprofenul poate prelungi timpul de sângerare),
- astm bronșic activ sau istoric de astm bronșic sau reacții alergice, poate apărea bronhospasm după administrarea medicamentului,
- aveți o infecție – vă rugăm să consultați rubrica „Infecții” de mai jos,
- boli pentru care luați alte medicamente (în special anticoagulante, diuretice, medicamente pentru inimă, corticosteroizi).

Alte AINS, inclusiv inhibitorii selectivi ai ciclooxygenazei-2, trebuie evitate atunci când se utilizează Ibuprofen US Pharmacia .

La pacienții deshidratați - copii și adolescenți, crește riscul de insuficiență renală.

### **Infecții**

Ibuprofen US Pharmacia poate ascunde semne de infecții, cum ar fi febra și durerea. Prin urmare, este posibil ca Ibuprofen US Pharmacia să întârzie tratamentul adecvat al infecției, ceea ce poate duce la un risc crescut de complicații. Acest lucru a fost observat în caz de pneumonie cauzată de bacterii și infecții bacteriene ale pielii legate de varicelă. Dacă luați acest medicament în timp ce aveți o infecție și simptomele infecției persistă sau se agravează, adresați-vă fără întârziere unui medic.

Există un risc de hemoragie gastrointestinală, ulcerare sau perforație, care pot fi letale și care nu sunt neapărat precedate de simptome de avertizare sau pot apărea la pacienții care au avut aceste simptome de avertizare. În caz de hemoragie sau ulcerare gastrointestinală, administrarea medicamentului trebuie întreruptă imediat. Pacienții cu istoric de boli gastrointestinale, în mod particular vârstnicii, trebuie să-și informeze medicul despre orice simptome neobișnuite legate de sistemul digestiv (mai ales în caz de sângerare), în special la începutul tratamentului.

Utilizarea simultană, pe termen lung, a diferitelor analgezice poate duce la afectarea rinichilor, cu risc de insuficiență renală (nefropatie analgezică).

Administrarea de medicamente antiinflamatoare/analgezice, cum este ibuprofenul, poate implica o ușoară creștere a riscului de infarct miocardic sau accident vascular cerebral, în special atunci când medicamentele sunt luate în doze mari. Nu depășiți doza recomandată și durata tratamentului.

Dacă simptomele persistă, se agravează sau nu se ameliorează după 3 zile sau dacă apar simptome noi, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră.

Înainte de a lua Ibuprofen US Pharmacia trebuie să discutați despre tratament cu medicul sau farmacistul dacă:

- aveți boli de inimă, cum sunt insuficiență cardiacă, angină pectorală (durere în piept), ați avut un infarct miocardic, ați avut o intervenție chirurgicală by-pass, aveți o boală arterială periferică (circulația slabă a sângelui la nivelul picioarelor, din cauza îngustării sau blocării arterelor) sau dacă ați avut orice accident vascular cerebral (inclusiv mini-accident vascular cerebral sau atac ischemic tranzitoriu – AIT);
- aveți tensiune arterială mare, diabet, aveți valori mari ale colesterolului, orice membru al familiei dumneavoastră a avut o boală de inimă sau un accident vascular cerebral sau dacă fumați.

Reacții la nivelul pielii

Au fost raportate reacții grave la nivelul pielii în asociere cu tratamentul cu Ibuprofen US Pharmacia. Trebuie să încetați să luați Ibuprofen US Pharmacia și să solicitați imediat asistență medicală, dacă aveți orice erupție pe piele, leziuni ale mucoaselor, vezicule sau alte semne de alergii, deoarece acestea pot fi primele semne ale unei reacții foarte grave la nivelul pielii. Vezi pct. 4.

Acest medicament aparține grupului de medicamente (antiinflamatoare nesteroidiene) care pot afecta fertilitatea la femei. Acest lucru este reversibil la întreruperea tratamentului.

#### **Ibuprofen US Pharmacia împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv cele fără prescripție medicală.

Ibuprofenul trebuie evitat în asociere cu:

- acid acetilsalicilic,
- alte AINS, inclusiv inhibitori selectivi ai ciclooxigenazei-2.

Ibuprofen US Pharmacia poate afecta activitatea altor medicamente sau alte medicamente pot afecta activitatea Ibuprofen US Pharmacia, de exemplu:

- anticoagulante (medicamente pentru subțierea sângelui/prevenirea formării cheagurilor de sânge, cum sunt acidul acetilsalicilic, warfarina, ticlopidina);
- medicamente care reduc tensiunea arterială (inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei, cum este captoprilul, beta-blocante, cum sunt medicamentele care conțin atenolol, antagoniști ai receptorilor de angiotensină II, cum este losartanul).

Ibuprofenul trebuie utilizat cu prudență împreună cu:

- diuretice,
- agenți antiplachetari și inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS),
- glicozide cardiace,
- litiu (medicament utilizat pentru tratarea maniei și a depresiei recurente) și metotrexat (medicament utilizat pentru a trata unele tipuri de cancer și poliartrita reumatoidă),
- ciclosporină,
- mifepristonă,
- tacrolimus,
- zidovudină (medicament antiviral),
- chinolone,
- corticosteroizi.

De asemenea, alte medicamente pot influența sau pot fi influențate de tratamentul cu Ibuprofen US Pharmacia. Prin urmare, înainte de a utiliza medicamentul Ibuprofen US Pharmacia împreună cu alte medicamente, trebuie să vă adresați întotdeauna medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

#### **Sarcina**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu luați Ibuprofen US Pharmacia dacă sunteți în ultimele 3 luni de sarcină, deoarece poate dăuna fătului sau poate cauza probleme la naștere. Poate provoca probleme renale și cardiace copilului dumneavoastră nenăscut. Poate afecta tendința dumneavoastră și a copilului de a sângera și poate determina întârzierea sau prelungirea travaliului pe o perioadă mai mare decât cea preconizată.

Nu trebuie să luați Ibuprofen US Pharmacia în primele 6 luni de sarcină, cu excepția cazului în care este absolut necesar și recomandat de medicul dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de tratament în această perioadă sau în timp ce încercați să rămâneți gravidă, trebuie utilizată cea mai mică doză, pentru cea mai scurtă perioadă posibilă. Începând cu săptămâna de sarcină 20, dacă este utilizat pe o perioadă mai mare de câteva zile, Ibuprofen US Pharmacia poate provoca probleme renale copilului dumneavoastră nenăscut, care pot duce la niveluri scăzute de lichid amniotic care înconjoară copilul (oligohidroamnios) sau la îngustarea unui vas de sânge (ductul arterial) în inima copilului. Dacă aveți nevoie de tratament mai mult de câteva zile, medicul dumneavoastră poate recomanda monitorizarea suplimentară.

#### **Alăptarea**

Ibuprofenul, în cantități mici, poate trece în laptele matern. Nu există reacții adverse cunoscute la sugari în perioada de alăptare, prin urmare nu este necesară întreruperea alăptării în timpul administrării pe termen scurt a medicamentului, în dozele recomandate. Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

#### **Fertilitate**

Vezi pct. „Atenționări și precauții”.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu este de așteptat ca Ibuprofen US Pharmacia să aibă vreo influență asupra conducerii vehiculelor și folosirii utilajelor după administrarea dozelor recomandate și pe durata specificată a tratamentului.

## **3. Cum să luați Ibuprofen US Pharmacia**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Medicamentul trebuie administrat pe cale orală, pentru o perioadă scurtă de timp.

Dacă aveți îndoieli, adresați-vă din nou medicului dumneavoastră. De obicei, se utilizează următoarele doze:

<Pentru Ibuprofen US Pharmacia 200 mg comprimate filmate>

**Adulți și adolescenți cu vârsta de peste 12 ani și greutate corporală > 40 kg:** doza inițială - 2 comprimate, apoi, dacă este necesar, 1 până la 2 comprimate la interval de 4 până la 6 ore. Comprimatele trebuie administrate cu apă. Nu utilizați mai mult de 6 comprimate (1200 mg ibuprofen) pe zi. Trebuie să se păstreze un interval de 4 ore între administrarea dozelor.

<Pentru Ibuprofen US Pharmacia 400 mg comprimate filmate>

**Adulți și adolescenți cu vârsta de peste 12 ani și greutate corporală > 40 kg:** 1 comprimat la interval de 4 ore. Comprimatele trebuie administrate cu apă. Nu utilizați mai mult de 3 comprimate (1200 mg ibuprofen) pe zi.

În caz de insuficiență hepatică sau renală, dozele trebuie ajustate individual de către medic.

Acest medicament nu este indicat la copii cu vârsta sub 12 ani.

**Pacienți vârstnici:** nu este necesară ajustarea dozei.

Nu trebuie să luați o doză mai mare decât cea recomandată.

Dacă este necesar să luați acest medicament mai mult de 3 zile sau dacă simptomele se agravează, trebuie să vă adresați unui medic.

Pentru ameliorarea simptomelor, trebuie utilizată cea mai mică doză eficientă, pentru cea mai scurtă perioadă de timp. Dacă aveți o infecție, solicitați fără întârziere consultul unui medic dacă simptomele (cum sunt febră și durere) persistă sau se agravează (vezi pct. 2).

#### **Dacă luați mai mult Ibuprofen US Pharmacia decât trebuie**

Cazurile de supradozaj sunt rare, totuși, dacă pacientul a luat o doză de Ibuprofen US Pharmacia mai mare decât cea recomandată sau dacă un copil a luat accidental medicamentul, trebuie să vă adresați unui medic sau să mergeți la cel mai apropiat spital pentru a afla o opinie despre posibilele riscuri pentru sănătate și pentru a primi sfaturi despre ce trebuie să faceți în acest caz.

Simptomele pot include: greață, dureri de stomac, vărsături (sunt posibile urme de sânge), dureri de cap, zgomote în urechi, confuzie și mișcări necontrolate ale globilor oculari. Manifestările pot include, de asemenea: dureri în partea superioară a abdomenului sau, rareori, diaree, hemoragii gastrointestinale. După administrarea unei doze mari au fost raportate cazuri de somnolență, dureri în piept, palpitații, pierdere a conștienței, convulsii (în special la copii), senzație de slăbiciune și de amețeală, sânge în urină, senzație de frig și probleme la respirație, acidoză metabolică (exces de acizi în sânge) și timpul de protrombină/INR poate fi crescut, pot apărea insuficiență renală acută sau afectarea ficatului. Este posibilă exacerbarea astmului bronșic la pacienții astmatici. Foarte rar pot apărea agitație și dezorientare sau comă și convulsii.

Nu există un antidot specific în caz de supradozaj. Tratamentul este simptomatic și de susținere și se concentrează pe susținerea semnelor vitale, până când medicamentul este îndepărtat din organism. Funcția cardiacă trebuie monitorizată și semnele vitale trebuie controlate, atât timp cât acestea sunt stabile. Medicul va lua în considerare administrarea de cărbune activat în decurs de o oră de la supradozaj. În caz de convulsii frecvente sau prelungite, trebuie administrat intravenos diazepam sau lorazepam. Pacienților cu astm bronșic trebuie să li se administreze bronhodilatatoare.

#### **Dacă uitați să luați Ibuprofen US Pharmacia**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

#### **Dacă încetați să luați Ibuprofen US Pharmacia**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse enumerate mai jos au fost observate în timpul utilizării pe termen scurt a ibuprofenului, în dozele disponibile fără prescripție medicală. Când se utilizează ibuprofen în alte indicații medicale și pentru o perioadă lungă de timp, pot apărea și alte reacții adverse.

Reacțiile adverse sunt clasificate în funcție de frecvența lor, folosind următoarele definiții:

Foarte frecvente ( $\geq 1/10$ )

Frecvente ( $\geq 1/100$  și  $< 1/10$ )

Mai puțin frecvente ( $\geq 1/1000$  și  $< 1/100$ )

Rare ( $\geq 1/10000$  și  $< 1/1000$ )

Foarte rare ( $< 1/10000$ )

Cu frecvență necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Mai puțin frecvente:

- dureri abdominale, greață, indigestie
- dureri de cap
- diverse erupții pe piele
- urticarie și mâncărimi.

Rare:

- diaree, senzație de balonare, constipație, vărsături, gastrită
- vertij (senzație de învârtire)
- tulburări psihice, depresie, insomnie, agitație
- tinitus (zgomote în urechi)
- iritabilitate, oboseală.

Foarte rare:

- ulcer peptic, perforație sau hemoragie gastrointestinală, scaune de culoare neagră, vărsături cu sânge (uneori letale, în special la vârstnici), stomatită ulceroasă, exacerbare a colitei și a bolii Crohn
- meningită aseptică
- insuficiență renală acută, necroză papilară, în special în cazul utilizării pe termen lung, asociate cu creșterea ureei serice și cu edemul, hipernatremie (retenție de sodiu), scădere a eliminării de urină
- tulburări ale ficatului
- tulburări de formare a celulelor din sânge (anemie, leucopenie - o reducere a numărului de leucocite, trombocitopenie - o reducere a numărului de trombocite, pancitopenie - tulburare hematologică, care implică un deficit al tuturor componentelor celulare normale ale sângelui: globule roșii și albe și trombocite, agranulocitoză - reducere a numărului de granulocite). Primele simptome sunt: febră, durere în gât, stomatită ulceroasă superficială, simptome asemănătoare gripei, oboseală, sângerări inexplicabile și vânătăi (de exemplu, peteșii, purpură și sângerare nazală)
- reacții grave la nivelul pielii, cum sunt reacții buloase, inclusiv sindrom Stevens-Johnson, eritem polimorf și necroliză epidermică toxică
- reacții de hipersensibilitate severe. Simptomele pot include: umflare a feței, limbii și laringelui, dificultăți la respirație, creștere a frecvenței bătăilor inimii, tensiune arterială mică (anafilaxie, angioedem sau șoc sever)
- insuficiență cardiacă și edem
- tensiune arterială mare
- scădere a valorii hemoglobinei.

Cu frecvență necunoscută:

- hiperreactivitate a căilor respiratorii, de exemplu astm bronșic, exacerbare a astmului bronșic, bronhospasm, dificultate la respirație

- poate apărea o reacție acută la nivelul pielii, cunoscută sub numele de sindrom DRESS. Simptomele sindromului DRESS includ: erupție pe piele, febră, ganglioni limfatici umflați și număr crescut de eozinofile (un tip de globule albe)
- o erupție extinsă pe piele, de culoare roșie, cu aspect de solzi, cu umflături sub piele și vezicule localizate în principal la nivelul pliurilor, trunchiului și extremităților superioare, însoțite de febră, la inițierea tratamentului (pustuloză exantematică generalizată acută). Oprțiți administrarea Ibuprofen US Pharmacia dacă dezvoltăți aceste simptome și solicitați imediat asistență medicală. Vezi și pct.2.
- pielea devine sensibilă la lumină.

La unii pacienți, în timpul administrării medicamentului, pot apărea și alte reacții adverse. În cazul în care observați simptomele menționate mai sus, precum și altele, care nu sunt enumerate în acest prospect, trebuie să întrerupeți tratamentul și să vă adresați medicului dumneavoastră.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Ibuprofen US Pharmacia**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare, înscrisă pe cutie după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Ibuprofen US Pharmacia**

- Substanța activă este ibuprofen.

- Celelalte componente sunt:

<Pentru Ibuprofen US Pharmacia 200 mg comprimate filmate>

- Celuloză microcristalină, amidon de porumb, amidon pregelatinizat, ulei vegetal hidrogenat, cros повідonă (tip A), talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru; Film: Opadry White 65F280000 (alcool polivinilic (E 1203), macrogol 3350 (E 1521), dioxid de titan (E 171), talc (E 553b), silicat de potasiu și aluminiu și dioxid de titan (E 171), ceară de carnauba;

<Pentru Ibuprofen US Pharmacia 400 mg comprimate filmate>

Celuloză microcristalină, amidon de porumb, amidon pregelatinizat, ulei vegetal hidrogenat, cros повідonă (tip A), talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru; Film: Opadry White 65F280000 (alcool polivinilic (E 1203), macrogol 3350 (E 1521), dioxid de titan (E 171), talc (E 553b), silicat de aluminiu și potasiu și dioxid de titan (E 171), ceară de carnauba.

### **Cum arată Ibuprofen US Pharmacia și conținutul ambalajului**

<Pentru Ibuprofen US Pharmacia 200 mg comprimate filmate>

Comprimate filmate albe sau aproape albe (15 mm x 6 mm), ușor lucioase, biconvexe, cu formă alungită și gravate cu „RR” pe o față.

Ibuprofen US Pharmacia este disponibil în cutii cu blistere care conțin 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30 comprimate. Ibuprofen US Pharmacia este disponibil în cutii cu flacoane care conțin 50, 96 de comprimate.

Blistere din PVC-PVDC/ Al într-o cutie de carton.

Flacoane de culoare violetă, de 70 ml, din PEÎD, cu capac violet din polietilenă de înaltă densitate, multistratificată, în cutie de carton.

<Pentru Ibuprofen US Pharmacia 400 mg comprimate filmate>

Comprimate filmate albe până la aproape albe (18 mm x 8 mm), ușor lucioase, biconvexe, cu formă alungită.

Ibuprofen US Pharmacia este disponibil în cutii cu blistere care conțin 6, 8, 10, 12, 20, 24, 48 comprimate.

Ibuprofen US Pharmacia este disponibil în cutii cu flacoane care conțin 48 de comprimate.

### Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

US Pharmacia Sp. z o.o.  
ul. Ziębicka 40  
50-507 Wrocław  
Polonia

**Acest medicament este autorizat în statele membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri:**

Polonia:	IBUPROM FORTE IBUPROM REGULAR
Bulgaria:	IBUPROM FORTE, 400 mg, film-coated tablets ИБУПРОМ ФОРТЕ, 400 mg, филмирани таблетки  IBUPROM REGULAR, 200 mg, film-coated tablets ИБУПРОМ РЕГУЛАР, 200 mg, филмирани таблетки
Estonia:	Ibuprofenum US Pharmacia Ibuprofenum US Pharmacia
Letonia:	Ibuprofenum US Pharmacia, 400 mg, apvalkotās tabletes Ibuprofenum US Pharmacia, 200 mg, apvalkotās tabletes
România:	Ibuprofen US Pharmacia 200 mg comprimate filmate Ibuprofen US Pharmacia 400 mg comprimate filmate

**Acest prospect a fost revizuit în august 2023.**