

Prospect: Informații pentru utilizator**Apixaban Teva B.V. 5 mg comprimate filmate**

apixaban

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Apixaban Teva B.V. și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Apixaban Teva B.V.
3. Cum să luați Apixaban Teva B.V.
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Apixaban Teva B.V.
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Apixaban Teva B.V. și pentru ce se utilizează

Apixaban Teva B.V. conține substanță activă apixaban și aparține unui grup de medicamente denumite anticoagulante. Acest medicament ajută la prevenirea formării de cheaguri de sânge prin blocarea Factorului Xa, care este un component important în coagularea săngelui.

Apixaban Teva B.V. este utilizat la adulții:

- pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge la nivelul inimii în cazul pacienților cu bătăi neregulate ale inimii (fibrilație atrială) și cel puțin un factor de risc suplimentar. Cheagurile de sânge se pot desprinde și pot ajunge până la creier, determinând un accident vascular cerebral, sau la alte organe, împiedicând curgerea normală a săngelui către organul respectiv (situație cunoscută, de asemenea, sub denumirea de embolie sistemică). Un accident vascular cerebral poate pune viața în pericol și necesită asistență medicală imediată.
- pentru a trata cheagurile de sânge formate la nivelul venelor picioarelor (tromboză venoasă profundă) și al vaselor de sânge din plămâni duminică (embolie pulmonară) și pentru a preveni reapariția cheagurilor de sânge în vasele de sânge de la nivelul picioarelor și/sau plămânilor.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Apixaban Teva B.V.**Nu luați Apixaban Teva B.V. dacă:**

- sunteți alergic la apixaban sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6)
- prezentați săngerări în exces

- aveți o **afecțune a unui organ** al corpului care crește riscul de sângeare gravă (precum un **ulcer activ sau ulcer recent** la nivelul stomacului sau intestinului, **sângeare recentă la nivelul creierului**)
- aveți o **boală de ficat** care determină creșterea riscului de sângeare (coagulopatie hepatică)
- **luăți medicamente care împiedică coagularea săngelui** (de exemplu warfarină, rivaroxaban, dabigatran sau heparină), cu excepția cazului în care este vorba despre schimbarea tratamentului anticoagulant, despre montarea unei linii venoase sau arteriale și vi se administrează heparină pe această linie pentru a menține deschisă sau dacă un tub este introdus în vasul de sânge (ablație prin cateter) pentru a trata bătăile neregulate ale inimii (aritmie).

Atenționări și precauții

Înainte să luăți acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă aveți oricare dintre următoarele:

- **un risc crescut de sângeare**, de exemplu:
 - **tulburări de sângeare**, inclusiv afecțuni care determină scăderea activității trombocitelor
 - **tensiune arterială foarte crescută**, necontrolată prin tratament medical
 - aveți vârstă mai mare de 75 ani
 - greutatea dumneavoastră este de 60 kg sau mai puțin
- **o boală de rinichi severă sau dacă sunteți tratat prin dializă**
- **o problemă la ficat sau ati avut probleme la ficat.** Apixaban Teva B.V. va fi utilizat cu precauție la pacienții cu semne de afectare a funcției ficatului.
- dacă aveți **proteză la o valvă a inimii**
- dacă medicul dumneavoastră stabilește că aveți tensiune arterială oscilantă sau dacă este planificat un alt tratament sau o intervenție chirurgicală pentru îndepărțarea cheagului de sânge de la nivelul plămânilor

Aveți grijă deosebită când luăți Apixaban Teva B.V.

- dacă știți că aveți o boală numită sindrom antifosfolipidic (o tulburare a sistemului imunitar care determină creșterea riscului de formare a cheagurilor de sânge), spuneți-i medicului dumneavoastră, care va hotărî dacă poate fi necesară schimbarea tratamentului.

Dacă trebuie să vi se efectueze o intervenție chirurgicală sau o procedură care poate provoca sângeare, medicul dumneavoastră vă poate cere să opriți temporar administrarea acestui medicament pentru o perioadă scurtă de timp. Dacă nu sunteți sigur dacă o anumită procedură vă poate provoca o sângeare, discutați cu medicul dumneavoastră.

Copii și adolescenți

Apixaban Teva B.V. nu este recomandat copiilor și adolescentilor cu vârstă sub 18 ani.

Apixaban Teva B.V. împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă luăți, ati luat recent sau s-ar putea să luăți orice alte medicamente.

Unele medicamente pot crește efectele Apixaban Teva B.V. în timp ce altele pot scădea aceste efecte. Medicul dumneavoastră va decide dacă veți urma tratament cu Apixaban Teva B.V. atunci când luăți aceste medicamente și cât de atent trebuie să fiți supravegheat.

Următoarele medicamente pot crește efectele Apixaban Teva B.V. și pot crește riscul de sângeare nedorită:

- **unele medicamente pentru infecții fungice** (de exemplu, ketoconazol etc.)
- **unele medicamente antivirale pentru HIV / SIDA** (de exemplu, ritonavir)
- **alte medicamente utilizate pentru reducerea coagulării săngelui** (de exemplu, enoxaparină etc.)

- **medicamente antiinflamatoare sau calmante ale durerii** (de exemplu, acid acetilsalicilic sau naproxen). În special dacă aveți vârstă peste 75 ani și luați acid acetilsalicilic, puteți avea un risc crescut de sânge.
- **medicamente pentru tratamentul tensiunii arteriale crescute sau pentru probleme cardiaice** (de exemplu, diltiazem)
- **medicamente antidepresive denumite inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei sau inhibitori ai recaptării serotoninei-norepinefrinei**

Următoarele medicamente pot scădea capacitatea Apixaban Teva B.V. de a ajuta la prevenirea formării cheagurilor de sânge:

- **medicamente pentru prevenirea epilepsiei sau a convulsiilor** (de exemplu, fenitoïnă etc.)
- **sunătoare** (un supliment din plante utilizat pentru tratamentul depresiei)
- **medicamente pentru tratamentul tuberculozei sau al altor infecții** (de exemplu, rifampicină)

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu se cunosc efectele apixabanului asupra sarcinii și asupra copilului nenăscut. Nu trebuie să luați Apixaban Teva B.V. dacă sunteți gravidă. **Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră** dacă rămâneți gravidă în timpul tratamentului cu Apixaban Teva B.V..

Nu se cunoaște dacă apixabanul se elimină în laptele uman. Dacă alăptați, cereți sfatul medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale înainte de a lua acest medicament. Ei vă vor recomanda fie să nu mai alăptați, fie să opriți administrarea Apixaban Teva B.V. sau să nu începeți să luați Apixaban Teva B.V..

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu s-a demonstrat că Apixaban Teva B.V. afectează capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Apixaban Teva B.V. conține lactoză (un tip de zahăr) și sodiu

Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele tipuri de glucide, adresați-vă medicului înainte să luați acest medicament.

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per comprimat, adică practic „nu conține sodiu”.

3. Cum să luați Apixaban Teva B.V.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră, cu farmacistul sau cu asistenta medicală dacă nu sunteți sigur.

Doza

Înghițiți comprimatul cu un pahar cu apă. Apixaban Teva B.V. se poate administra cu sau fără alimente. Încercați să luați comprimatele la aceeași oră în fiecare zi pentru a obține cel mai bun efect al tratamentului.

Dacă vă este dificil să înghițiți comprimatul întreg, adresați-vă medicului dumneavoastră cu privire la alte modalități de a lua Apixaban Teva B.V.. Comprimatul poate fi zdrobit și amestecat cu apă, cu soluție de dextroză 5%, cu suc de mere sau piure de mere, imediat înainte de a-l lua.

Instrucțiuni pentru zdrobire:

- Zdrobiți comprimatele cu ajutorului unui mojar cu pistil.
- Transferați cu grijă toată pulberea într-un recipient adekvat, apoi amestecați pulberea cu o cantitate mică, de exemplu 30 ml (2 linguri), de apă sau dintr-unul din celelalte lichide menționate mai sus pentru a face un amestec.
- Înghițiți amestecul.
- Clătiți mojarul și pistilul pe care le-ați utilizat pentru zdrobirea comprimatului și recipientul cu puțină apă sau puțin dintr-unul din celelalte lichide (de exemplu 30 ml) și înghițiți lichidul cu care ați clătit.

Dacă este necesar, medicul dumneavoastră vă poate administra, de asemenea, comprimatul Apixaban Teva B.V. zdrobotit și amestecat în 60 ml de apă sau soluție de dextroză 5%, printr-o sondă nazogastrică.

Luați Apixaban Teva B.V. aşa cum v-a fost recomandat pentru:

Prevenirea formării unui cheag de sânge la nivelul inimii la pacienții cu bătăi neregulate ale inimii și cel puțin un factor de risc suplimentar

Doza recomandată este de un comprimat de **5 mg** de două ori pe zi.

Doza recomandată este de un comprimat de **2,5 mg** de două ori pe zi dacă:

- aveți o reducere severă a funcției renale
- două sau mai multe dintre următoarele se aplică în cazul dumneavoastră:
 - analizele dumneavoastră de sânge indică o funcție renală deficitară (valoarea creatininei serice este de 1,5 mg/dl (133 micromoli/l) sau mai mare
 - aveți vârstă de 80 ani sau peste
 - aveți o greutate corporală de 60 kg sau mai mică.

Doza recomandată este de un comprimat de două ori pe zi, de exemplu, un comprimat dimineața și unul seara. Medicul dumneavoastră va decide cât timp trebuie să continuați tratamentul.

Tratamentul cheagurilor de sânge formate la nivelul venelor picioarelor și al vaselor de sânge din plămânii dumneavoastră

Doza recomandată este de **două comprimate de 5 mg** de două ori pe zi în primele 7 zile, de exemplu, două comprimate dimineața și două seara.

După 7 zile, doza recomandată este de **un comprimat de 5 mg** de două ori pe zi, de exemplu, un comprimat dimineața și unul seara.

Prevenirea reapariției cheagurilor de sânge după încheierea tratamentului cu durata de 6 luni

Doza recomandată este de un comprimat de **2,5 mg** de două ori pe zi, de exemplu, un comprimat dimineața și unul seara.

Medicul dumneavoastră va decide cât timp trebuie să continuați tratamentul.

Medicul dumneavoastră vă poate schimba tratamentul anticoagulant după cum urmează:

- *Trecerea de la tratamentul cu Apixaban Teva B.V. la medicamente anticoagulante*
Opriți administrarea Apixaban Teva B.V.. Începeți tratamentul cu medicamente anticoagulante (de exemplu heparină) la ora la care ar fi trebuit să luați următorul comprimat.
- *Trecerea de la medicamente anticoagulante la tratamentul cu Apixaban Teva B.V.*
Opriți administrarea medicamentelor anticoagulante. Începeți tratamentul cu Apixaban Teva B.V. la ora la care ar fi trebuit administrată următoarea doză din medicamentul anticoagulant, apoi continuați administrarea conform orarului obișnuit.

- *Trecerea de la tratamentul cu anticoagulant care conține un antagonist al vitaminei K (de exemplu warfarină) la tratamentul cu Apixaban Teva B.V.*
Oprîți administrarea medicamentului care conține un antagonist al vitaminei K. Medicul dumneavoastră trebuie să vă facă analize de sânge și să vă informeze în legătură cu momentul în care să începeți să luați Apixaban Teva B.V..
- *Trecerea de la tratamentul cu Apixaban Teva B.V. la tratament anticoagulant care conține un antagonist al vitaminei K (de exemplu, warfarină)*
Dacă medicul dumneavoastră vă spune că trebuie să începeți să luați un medicament care conține un antagonist al vitaminei K, continuați administrarea Apixaban Teva B.V. timp de cel puțin 2 zile după prima doză din medicamentul care conține un antagonist al vitaminei K. Medicul dumneavoastră trebuie să vă facă analize de sânge și să vă informeze când să oprîți administrarea Apixaban Teva B.V..

Pacienți supuși cardioversiei

Dacă ritmul abnormal al inimii dumneavoastră trebuie să fie readus la normal printr-o procedură numită cardioversie, luați Apixaban Teva B.V. în momentul în care vă spune medicul dumneavoastră, pentru a preveni formarea de cheaguri de sânge în vasele de sânge din creierul dumneavoastră și alte vase de sânge din corp.

Dacă luați mai mult Apixaban Teva B.V. decât trebuie

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă ați luat mai multe comprimate de Apixaban Teva B.V. decât doza recomandată. Luați cutia medicamentului cu dumneavoastră, chiar dacă nu mai conține comprimate.

Dacă luați mai mult Apixaban Teva B.V. decât vi s-a recomandat, puteți avea un risc crescut de sângeare. Dacă apare sângeare, poate fi necesară o intervenție chirurgicală, transfuzii de sânge sau alte tratamente care pot neutraliza activitatea anti-factor Xa.

Dacă uitați să luați Apixaban Teva B.V.

Luați doza imediat ce vă amintiți și:

- luați următoarea doză de Apixaban Teva B.V. la ora obișnuită
- apoi continuați să le luați ca de obicei.

Dacă nu sunteți sigur ce să faceți sau ați omis mai mult de o doză, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

Dacă încetați să luați Apixaban Teva B.V.

Nu încetați să luați Apixaban Teva B.V. fără să discutați mai întâi cu medicul dumneavoastră, deoarece riscul de apariție a cheagurilor de sânge poate crește dacă tratamentul este întrerupt prea devreme.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Cea mai frecventă reacție adversă generală asociată cu apixaban este sângearea, care poate pune viața în pericol și necesită asistență medicală imediată.

Următoarele reacții adverse pot să apară dacă luați Apixaban Teva B.V. pentru prevenirea formării

cheagurilor de sânge la nivelul inimii la pacienții cu bătăi neregulate ale inimii și cel puțin un factor de risc suplimentar.

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

- Sângerare, inclusând:
 - sângerare la nivelul ochilor
 - sângerare la nivelul stomacului sau intestinului
 - de la nivelul rectului
 - sânge în urină
 - sângerare nazală
 - sângerare la nivelul gingiilor
 - vânătăi și umflături
- Anemie care poate determina oboseală sau paloare
- Tensiune arterială mică care poate determina stare de leșin sau accelerarea bătăilor inimii
- Greață (senzație de rău)
- Testele de sânge pot arăta:
 - o creștere a valorilor unei enzime a ficiatului (gama glutamil transferază (GGT))

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

- Sângerare:
 - sângerare la nivelul creierului sau al coloanei vertebrale
 - sângerare la nivelul gurii sau eliminare de sânge prin tuse
 - sângerare la nivelul abdomenului sau vaginului
 - sânge roșu în materiile fecale
 - sângerare apărută după intervenția dumneavoastră chirurgicală, inclusând vânătăi și umflături, sânge sau lichid care se scurge de la nivelul plăgii/inciziei chirurgicale (secreție a plăgii) sau de la locul de injectare
 - dintr-un hemoroïd
 - rezultatele testelor indică prezența de sânge în materiile fecale sau în urină
- Scădere numărului de placete din săngele dumneavoastră (care poate afecta coagularea)
 - Testele de sânge pot arăta:
 - funcționare anormală a ficiatului
 - o creștere a valorilor unor enzime ale ficiatului
 - o creștere a valorii bilirubinei, un produs apărut din degradarea celulelor roșii din sânge, care poate determina colorarea în galben a pielii și a ochilor
 - Erupție trecătoare pe piele
 - Mâncărimi la nivelul pielii
 - Cădere părului
 - Reacții alergice (hipersensibilitate) care pot determina: umflare a feței, buzelor, gurii, limbii și/sau a gâtului și dificultate în respirație. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre aceste simptome.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

- Sângerare:
 - la nivelul plămânilor sau al gâtului
 - la nivelul spațiului situat în spatele cavității dumneavoastră abdominală
 - la nivelul unui mușchi

Următoarele reacții adverse pot să apară dacă luați Apixaban Teva B.V. pentru tratamentul sau prevenirea reapariției cheagurilor de sânge la nivelul venelor picioarelor și al vaselor de sânge din plămâni dumneavoastră.

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

- Sângerare, inclusiv:
 - sângerare nazală
 - sângerare la nivelul gingiilor
 - sânge în urină
 - vânătăi și umflături
 - sângerare la nivelul stomacului, intestinului, de la nivelul rectului dumneavoastră
 - la nivelul gurii
 - de la nivelul vaginalului
- Anemie care poate determina oboseală sau paloare
- Scădere numărului de placete din săngele dumneavoastră (care poate afecta coagularea)
- Greață (senzație de rău)
- Erupție trecătoare pe piele
- Testele de sânge pot arăta:
 - o creștere a valorilor enzimelor ficatului: a gama glutamil transferazei (GGT) sau alanin aminotransferazei (ALT)

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

- Tensiune arterială mică care poate determina stare de leșin sau accelerarea bătăilor inimii
- Sângerare:
 - sângerare la nivelul ochilor
 - sângerare la nivelul gurii sau eliminare de sânge prin tuse
 - sânge roșu în materiile fecale
 - rezultatele testelor indică prezența de sânge în materiile fecale sau în urină
 - sângerare apărută după intervenția dumneavoastră chirurgicală, inclusiv vânătăi și umflături, sânge sau lichid care se scurge de la nivelul plăgii/inciziei chirurgicale (secreție a plăgii) sau de la locul de injectare
 - dintr-un hemoroid
 - la nivelul unui mușchi
- Mâncărimi la nivelul pielii
- Cădere părului
- Reacții alergice (hipersensibilitate) care pot determina: umflarea feței, buzelor, gurii, limbii și/sau a gâtului și dificultate în respirație. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre aceste simptome.
- Testele de sânge pot arăta:
 - funcționare anormală a ficatului
 - o creștere a valorilor unor enzime ale ficatului
 - o creștere a valorii bilirubinei, un produs apărut din degradarea celulelor roșii din sânge, care poate determina colorarea în galben a pielii și a ochilor

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

- Sângerare:
 - sângerare la nivelul creierului sau al coloanei vertebrale
 - sângerare la nivelul plămânilor

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

- Sângerare:
 - la nivelul abdomenului sau al spațiului situat în spatele cavității dumneavoastră abdominală

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
București 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Apixaban Teva B.V.

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, flacon și blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Apixaban Teva B.V.

- Substanța activă este apixaban. Fiecare comprimat conține apixaban 5 mg.
- Celelalte componente sunt:
 - Nucleul comprimatului: lactoză anhidră (vezi pct. 2), celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu.
 - Film: lactoză monohidrat (vezi pct. 2), hipromeloză (E464), dioxid de titan (E171), macrogol 3350, triacetină, oxid roșu de fer (E172).

Cum arată Apixaban Teva B.V. și conținutul ambalajului

Comprimatele filmate sunt ovale, de culoare roz pal și inscripționate cu "TV" pe o parte și cu "G2" pe cealaltă parte a comprimatului. Dimensiune: diametru de 9,9 – 10,5 mm, lățime de 5,0 – 5,6 mm, grosime de 4,2 – 4,8 mm.

Apixaban Teva B.V. este disponibil sub formă de:

- Blistere pentru eliberarea unei unități dozate cu 10 X 1, 14 X 1, 20 X 1, 28 X 1, 30 X 1, 56 X 1, 60 X 1, 100 X 1, 120 X 1, 168 X 1, 200 X 1 comprimate filmate
- Flacoane cu 180, 200 și 500 comprimate filmate și
- Flacoane cu 180, 200 și 500 comprimate filmate, cu tampon de vată în interior

Este posibil ca nu toate mărimele de ambalaj să fie comercializate.

Card de atenționare pentru pacient: informații de utilizare

În interiorul ambalajului de Apixaban Teva B.V. veți găsi, alături de prospect, un Card de atenționare pentru pacient sau este posibil ca medicul dumneavoastră să vă înmâneze un card similar.

Acest Card de atenționare pentru pacient include informații care vă vor fi utile și avertizează alți medici că sunteți tratat cu Apixaban Teva B.V.. **Trebuie să purtați întotdeauna acest card asupra dumneavoastră.**

1. Luați cardul
2. Completați următoarele secțiuni sau cereți medicului dumneavoastră să facă acest lucru:
 - Numele:

- Data nașterii:
- Indicație:
- Doză:..... mg de două ori pe zi
- Numele medicului:
- Numărul de telefon al medicului:
- 3. Împărturiți cardul și purtați-l întotdeauna asupra dumneavoastră

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul:

Deținătorul Autorizației de punere pe piață

Teva B.V.
Swensweg 5, Haarlem, 2031GA
Țările de Jos

Fabricanții

Teva UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park
Eastbourne, BN22 9AG
Marea Britanie

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5, Haarlem, 2031GA
Țările de Jos

Balkanpharma-Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse
Dupnitsa 2600
Bulgaria

Acvest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

- | | |
|----|--|
| AT | Apixaban ratiopharm 2,5 mg Filmtabletten
Apixaban ratiopharm 5 mg Filmtabletten |
| BE | Apixaban Teva B.V. 2,5 mg filmomhulde tabletten / comprimés pelliculés /Filmtabellen
Apixaban Teva B.V. 5 mg filmomhulde tabletten / comprimés pelliculés /Filmtabellen |
| BG | Апиксабан Тева 2,5 mg филмираны таблетки
Апиксабан Тева 5 mg филмиранитаблетки |
| CZ | Apixaban Teva B.V. |
| DE | Apixaban-ratiopharm 2,5 mg Filmtabellen
Apixaban-ratiopharm 5 mg Filmtabellen |
| DK | Apixaban Teva B.V. |
| EE | Apixaban Teva B.V. |
| ES | Apixaban Teva B.V. 2,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Apixaban Teva B.V. 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG |
| FI | Apixaban ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Apixaban ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen |
| FR | Apixaban Teva B.V. 2,5 mg, comprimé pelliculé
Apixaban Teva B.V. 5 mg, comprimé pelliculé |
| HR | Apiksaban Teva 2,5 mg filmom obložene tablete
Apiksaban Teva 5 mg filmom obložene tablete |
| HU | Apixaban-Teva 2,5 mg filmtabetta
Apixaban-Teva 5 mg filmtabetta |
| IE | Apixaban Teva B.V. 2.5 mg and 5 mg Filmcoated Tablets |
| IS | Apixaban Teva B.V. |
| IT | APIXABAN TEVA B.V. |
| LT | Apixaban Teva B.V. 2,5 mg plévele dengtos tabletės |

	Apixaban Teva B.V. 5 mg plévele dengtos tabletés
LV	Apixaban Teva B.V. 2,5 mg apvalkotās tablets Apixaban Teva B.V. 5 mg apvalkotās tabletes
LU	Apixaban-ratiopharm 2,5 mg Filmtabletten Apixaban-ratiopharm 5 mg Filmtabletten
NL	Apixaban Teva B.V. 2,5 mg, filmomhulde tabletten Apixaban Teva B.V. 5 mg, filmomhulde tabletten
NO	Apixaban Teva B.V.
PL	Apixaban Teva B.V.
RO	Apixaban Teva B.V. 2,5 mg comprimate filmate Apixaban Teva B.V. 5 mg comprimate filmate
SE	Apixaban Teva B.V. 2,5mg, 5mg filmdragerade tabletter
SI	Apiksaban Teva 2,5 mg filmsko obložene tablete Apiksaban Teva 5 mg filmsko obložene tablete
SK	Apixaban Teva B.V. 2,5 mg Apixaban Teva B.V. 5 mg
UK	Apixaban Teva B.V. 2.5 mg and 5 mg Filmcoated Tablets

Acest prospect a fost revizuit în August 2024.