

### Prospect: Informații pentru utilizator

**Alprazolam Grindeks 0,25 mg comprimate**  
**Alprazolam Grindeks 0,5 mg comprimate**  
**Alprazolam Grindeks 1 mg comprimate**  
alprazolam

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Alprazolam Grindeks și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Alprazolam Grindeks
3. Cum să luați Alprazolam Grindeks
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Alprazolam Grindeks
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Alprazolam Grindeks și pentru ce se utilizează**

Alprazolam Grindeks este un sedativ și aparține grupului benzodiazepinelor.

Alprazolam Grindeks este utilizat la adulți pentru tratamentul simptomelor severe de anxietate, care duc la dizabilități sau provoacă pacientului o mare suferință. Acest medicament este doar pentru utilizare pe termen scurt.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să luați Alprazolam Grindeks**

##### **Nu luați Alprazolam Grindeks**

- dacă sunteți alergic la alprazolam, la alte benzodiazepine sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6),
- dacă aveți o boală numită „miastenia gravis”, în cadrul căreia aveți slăbiciune și oboseală a mușchilor,
- dacă aveți probleme severe la nivelul pieptului sau dificultăți la respirație (de exemplu, bronșită cronică sau emfizem),
- dacă aveți „apnee în somn” - aceasta este o afecțiune în care respirația dumneavoastră devine neregulată, chiar oprindu-se pentru perioade scurte, în timp ce dormiți,
- dacă aveți probleme severe ale ficatului.

#### **Atenționări și precauții**

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua Alprazolam Grindeks:

- dacă abuzați sau ați abuzat de alcool, droguri sau medicamente
- dacă luați alprazolam de mult timp, deoarece efectul poate scădea
- dacă aveți o stare generală afectată
- dacă aveți probleme cu plămâni, rinichii sau ficatul
- dacă luați alte medicamente pentru boli mintale.

#### *Dependență*

Utilizarea Alprazolam Grindeks poate duce la dependență fizică și psihică de medicament.

Riscul de dependență este crescut în funcție de doză și de durata tratamentului. Prin urmare, durata tratamentului trebuie să fie cât mai scurtă posibil. Urmați recomandările medicului dumneavoastră privind dozele (vezi pct. 3). Observați dependența psihologică prin faptul că nu doriți să încetați să luați medicamentul. Dependența fizică înseamnă că apar simptome de sevraj atunci când tratamentul cu acest medicament este întrerupt brusc. Riscul este și mai mare la pacienții care abuzează sau au abuzat de alcool sau de medicamente (vezi și pct. 3. „Dacă încetați să luați Alprazolam Grindeks”). Abuzul de medicamente este un risc cunoscut asociat cu Alprazolam Grindeks. Dacă acest medicament este utilizat în abuz, acest lucru poate duce la supradozaj și deces. Urmați întotdeauna recomandările medicului dumneavoastră privind dozele. Acest medicament poate fi căutat de persoanele care abuzează de medicamentele eliberate pe bază de rețetă și trebuie păstrat astfel încât să nu fie la îndemâna altor persoane.

#### *Tulburări de memorie*

În timpul tratamentului cu alprazolam, memoria dumneavoastră poate fi perturbată. Acest lucru apare de obicei la câteva ore după ce medicamentul a fost luat. Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră dacă observați un astfel de simptom. Pentru a reduce riscul, trebuie să vă asigurați că puteți dormi o noapte întreagă (7 până la 8 ore) în timp ce luați acest medicament.

#### *Boli mintale (psihoză)*

Dacă aveți psihoză, o boală mintală severă care vă perturbă comportamentul, acțiunile și autocontrolul, atunci Alprazolam Grindeks nu este adecvat pentru dumneavoastră.

#### *Impact asupra stării de spirit*

Utilizarea alprazolamului poate crește riscul de episoade de hipomanie (o formă mai ușoară de manie) și manie (stare mentală hiperactivă, euforie excesivă și energie crescută) la pacienții cu depresie. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă dezvoltăți semne de hipomanie sau manie.

#### *Depresie, gânduri de a vă răni sau de a vă sinucide*

Tratamentul cu alprazolam poate crește riscul de a dezvolta gânduri de a vă răni sau de a vă sinucide, dacă aveți depresie. Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră înainte de a începe tratamentul cu alprazolam.

Dacă este necesar tratamentul cu alprazolam și dacă sunteți deprimat sau ați avut anterior gânduri de vătămare sau sinucidere, medicul dumneavoastră vă va monitoriza îndeaproape. Dacă aveți gânduri de a vă răni sau de a vă sinucide în orice moment, adresați-vă medicului dumneavoastră sau mergeți imediat la spital.

#### *Vârstnici*

Fiți deosebit de atenți când utilizați alprazolam dacă sunteți vârstnic, deoarece acesta poate provoca oboseală crescută și/sau slăbiciune musculară, care pot crește riscul de cădere.

#### **Copii și adolescenți**

Nu administrați acest medicament copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani, deoarece siguranța și eficacitatea nu au fost stabilite.

#### **Alprazolam Grindeks împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Efectul tratamentului poate fi afectat dacă Alprazolam Grindeks este luat împreună cu alte medicamente utilizate pentru a trata afecțiunile enumerate. Este posibil să fie necesar ca medicul dumneavoastră să vă ajusteze doza.

- Probleme mentale (medicamente antipsihotice, inclusiv clozapină)
- tulburări de somn (medicamente pentru somn)
- alergii sau febra fânului (unele antihistaminice)
- dacă vi se efectuează o intervenție chirurgicală majoră (anestezice)
- durere severă (analgice narcotice, de exemplu dextropropoxifen)
- terapie împotriva dependenței de droguri (tratament de substituție)
- probleme precum anxietatea sau depresia, inclusiv anumite antidepresive care conțin fluoxetină, fluvoxamină, nefazodonă sau imipramină
- insuficiență cardiacă (digoxină)
- infecții (antibiotice care conțin eritromicină, claritromicină sau telitromicină)
- infecții fungice (itraconazol, fluconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol)
- medicamente pentru tratarea anginei pectorale și a hipertensiunii arteriale, cum este diltiazem
- HIV și SIDA (numiți inhibitori de protează HIV, cum ar fi ritonavir)
- arsuri la stomac și ulcer gastric, cum ar fi cimetidină sau omeprazol
- astm bronșic și bronșită, precum teofilina
- epilepsie, cum ar fi carbamazepină
- medicamente relaxante musculare. Atunci când este utilizat împreună cu alprazolam, poate exista o creștere a efectului de relaxare musculară și un risc de cădere.

Utilizarea concomitentă a Alprazolam Grindeks cu opioide (calmante puternice, medicamente pentru terapia de substituție și unele remedii pentru tuse) crește riscul de somnolență, dificultăți la respirație (deprimare respiratorie), comă și poate pune viața în pericol. Din acest motiv, utilizarea concomitentă trebuie luată în considerare numai atunci când alte opțiuni de tratament nu sunt posibile.

Cu toate acestea, dacă medicul dumneavoastră vă prescrie Alprazolam Grindeks împreună cu opioide, doza și durata tratamentului concomitent trebuie limitate de medicul dumneavoastră.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele opioide pe care le luați și să urmați îndeaproape recomandarea medicului dumneavoastră privind doza. Ar putea fi util să informați prietenii sau rudele pentru a fi conștienți de semnele și simptomele menționate mai sus. Contactați medicul dumneavoastră atunci când aveți astfel de simptome.

De asemenea, este posibil ca efectul tratamentului cu alprazolam să fie afectat de tratamentul concomitent cu oricare dintre următoarele medicamente: comprimate contraceptive, rifampicină (pentru infecții) sau sunătoare (medicament pe bază de plante).

### **Alprazolam Grindeks împreună cu alcool**

Trebuie să vă abțineți de la consumul de alcool în timpul tratamentului cu Alprazolam Grindeks, deoarece alcoolul poate modifica și spori efectul Alprazolam Grindeks în moduri imprevizibile.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

#### Sarcină

Trebuie să spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Observațiile la om au arătat că alprazolamul poate fi dăunător pentru făt (risc crescut de malformație (despicătură a cerului gurii)). În timpul sarcinii, alprazolamul poate fi utilizat numai dacă medicul a stabilit că beneficiile tratamentului depășesc riscurile pentru copilul nenăscut și că medicamentul este potrivit pentru dumneavoastră.

Dacă utilizați Alprazolam Grindeks până la naștere, informați-vă medicul deoarece nou-născutul dumneavoastră poate dezvolta simptome de sevraj după naștere.

#### Alăptare

Alprazolam Grindeks nu trebuie luat dacă alăptați. Alprazolamul trece în laptele matern. Dacă medicul dumneavoastră a decis că trebuie să utilizați acest medicament, va trebui să întrerupeți alăptarea.

#### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Chiar și atunci când este utilizat conform recomandărilor, Alprazolam Grindeks poate modifica abilitățile de reacție într-o asemenea măsură încât capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje este afectată. Acest risc este deosebit de mare la începutul tratamentului, ori de câte ori doza este crescută, dacă nu dormiți suficient sau dacă consumați și alcool sau luați alte substanțe care acționează asupra sistemului nervos central. Prin urmare, trebuie să vă abțineți complet de la conducerea vehiculelor, folosirea utilajelor sau efectuarea oricăror alte activități periculoase sau cel puțin în primele zile de tratament. Decizia în fiecare caz individual este luată de medicul curant.

#### **Alprazolam Grindeks conține lactoză, sodiu și benzoat de sodiu (E211)**

- Lactoză: Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.
- Sodiu: Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per doză, adică practic „nu conține sodiu”.
- Benzoat de sodiu: Acest medicament conține benzoat de sodiu 0,12 mg în fiecare comprimat.

### **3. Cum să luați Alprazolam Grindeks**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

#### **Dacă nu este prescris altfel de către medic, se aplică următoarele recomandări privind dozele**

Doza inițială: în general, doza la începutul tratamentului este de 0,25 până la 0,5 mg alprazolam de trei ori pe zi.

Doza de întreținere: dacă este necesar din punct de vedere clinic, medicul dumneavoastră vă poate crește doza până la 3 mg până la 4 mg, în trepte mici, împărțite în mai multe doze individuale.

#### Pacienți vârstnici și fragili sau pacienți cu debilități

Dacă sunteți un pacient mai în vârstă și fragil și aveți nevoie de o doză mai mică, veți începe în mod normal cu o doză de 0,25 mg de două până la trei ori pe zi. Această doză poate fi crescută lent, dacă este necesar și dacă nu aveți reacții adverse.

#### Pacienți cu probleme ale rinichilor sau ficatului

Dacă aveți probleme cu rinichii sau ficatul, medicul dumneavoastră vă va ajusta doza.

#### **Utilizare la copii și adolescenți**

Copiii și adolescenții cu vârsta sub 18 ani nu trebuie să ia Alprazolam Grindeks.

#### **Mod de administrare**

Alprazolam Grindeks este pentru administrare orală. Luați comprimatele cu puțin lichid (de exemplu, jumătate de pahar cu apă).

Comprimatele au o linie mediană și pot fi divizate în doze egale.

#### **Durata tratamentului**

Riscul de dependență și abuz poate crește odată cu doza și durata tratamentului. Prin urmare, medicul va prescrie cea mai mică doză eficientă și pe cea mai scurtă durată a tratamentului posibilă și va reevalua frecvent necesitatea continuării tratamentului.

Durata maximă a tratamentului nu trebuie să depășească 2-4 săptămâni. Tratamentul pe termen lung nu este recomandat. Se poate dezvolta un efect scăzut al medicamentului dacă este utilizat mai mult de câteva săptămâni.

#### **Dacă luați mai mult Alprazolam Grindeks decât trebuie**

Dacă ați luat prea mult Alprazolam Grindeks, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau spitalului local.

Semnele de supradozaj (ușoare) pot fi somnolență, amețeli, tulburări de vedere, vorbire neclară, scădere marcată a tensiunii arteriale, mers/mișcări instabile și slăbiciune musculară. În cazuri de intoxicație severă, pot apărea somn profund și chiar inconștiență, tulburări de respirație și colaps circulator. Monitorizarea terapiei intensive este esențială.

Evaluarea gradului de intoxicație trebuie făcută de către medic, care va decide asupra măsurilor de tratare a acesteia.

#### **Dacă uitați să luați Alprazolam Grindeks**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Dacă uitați să vă luați doza, săriți peste doza uitată și continuați să luați Alprazolam Grindeks așa cum v-a prescris medicul dumneavoastră.

#### **Dacă încetați să luați Alprazolam Grindeks**

Discutați întotdeauna cu medicul dumneavoastră înainte de a înceta să luați Alprazolam Grindeks, deoarece doza trebuie redusă treptat. Dacă încetați să luați comprimatele sau reduceți brusc doza, puteți avea efecte de „revenire” care vă pot determina să deveniți temporar mai anxios sau neliniștit sau să aveți dificultăți cu somnul. Unele persoane pot prezenta, de asemenea, efecte de „sevrăj” (vezi pct. 4. „Dependență și simptome de sevrăj”). Aceste simptome vor dispărea, pe măsură ce corpul dumneavoastră se obișnuiește cu tratamentul. Dacă sunteți îngrijorat, medicul dumneavoastră vă poate spune mai multe despre acest lucru. Prin urmare, medicul dumneavoastră va reduce treptat doza la terminarea tratamentului. Reducerea dozei se face în funcție de nevoile individuale, deoarece întreruperea treptată a tratamentului depinde de mai mulți factori (de exemplu, durata tratamentului și doza zilnică). Întrebați-vă medicul despre cum să vă reduceți treptat doza.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

#### **Motive pentru a vă adresa imediat medicului dumneavoastră**

Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră, deoarece tratamentul va trebui întrerupt. Medicul dumneavoastră vă va sfătui apoi cum va fi oprit tratamentul.

- Tratamentul cu alprazolam poate provoca efecte comportamentale sau psihice grave - de exemplu agitație, neliniște, agresivitate, iritabilitate, furie violentă, convingeri false, coșmaruri și halucinații sau alt comportament inadecvat.
- Respirație șuierătoare bruscă, dificultăți la înghițire sau la respirație, umflare a pleoapelor, feței sau buzelor, erupție pe piele sau mâncărime (care afectează în special întregul corp).

#### **Motive pentru a vă adresa medicului dumneavoastră cât mai curând posibil**

Spuneți medicului dumneavoastră cât mai curând posibil dacă aveți următoarele simptome, deoarece ar putea fi necesar să vă modifice doza sau tratamentul:

- Pierdere a memoriei (amnezie).
- Îngălbenire a pielii și a albului ochilor (icter).

### **Dependență și simptome de sevraj**

Este posibil să deveniți dependent de medicamente precum alprazolam în timp ce le luați, ceea ce crește probabilitatea de a prezenta simptome de sevraj atunci când opriți tratamentul. Simptomele de sevraj sunt mai frecvente dacă:

- opriți brusc tratamentul
- ați luat doze mari
- luați acest medicament de mult timp
- aveți antecedente de abuz de alcool sau droguri.

Acest lucru poate provoca efecte precum dureri de cap, dureri musculare, anxietate extremă, tensiune, neliniște, confuzie, schimbări de dispoziție, dificultăți cu somnul și iritabilitate.

În cazurile severe de sevraj, puteți avea și următoarele simptome: greață (senzație de rău), vărsături, transpirații, crampe stomacale, crampe musculare, o senzație de irealitate sau detașare, sunteți neobișnuit de sensibil la sunet, lumină sau contact fizic, amorțeală și furnicături la nivelul picioarelor și mâinilor, halucinații (vedeți sau auziți lucruri care nu există în realitate), tremor sau crize epileptice. Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre simptomele de sevraj se agravează sau nu dispăre.

### **Alte reacții adverse care pot apărea sunt:**

#### **Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane**

- Depresie
- Somnolență și amorțeală
- Mișcări sacadate, necoordonate
- Incapacitatea de a reține părți din informații
- Vorbire neclară
- Amețeală, stare euforică
- Dureri de cap
- Constipație
- Gură uscată
- Oboseală
- Iritabilitate.

#### **Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane**

- Pierdere a poftei de mâncare
- Confuzie și dezorientare
- Modificări ale apetitului sexual (bărbați și femei)
- Nervozitate sau senzație de anxietate sau agitație
- Insomnie (incapacitatea de a dormi sau tulburare a somnului)
- Probleme de echilibru și instabilitate (asemănătoare cu starea de beție), mai ales în timpul zilei
- Pierdere a vigilenței sau a concentrării
- Incapacitate de a rămâne treaz, senzație de moleșală
- Tremurături sau tremor
- Vedere dublă sau încețoșată
- Greață
- Reacții pe piele
- Modificări ale greutateii.

#### **Mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 de persoane**

- Senzație de bucurie sau de excitabilitate, ceea ce provoacă un comportament neobișnuit
- Halucinații (vedeți sau auziți lucruri care nu există în realitate)

- Senzație de agitație sau furie
- Vărsături
- Spasme sau slăbiciune musculară
- Incontinență
- Dureri sub formă de crampe în partea inferioară a spatelui și la nivelul coapselor, care pot indica tulburări menstruale
- Dependență de medicament
- Simptome de sevraj la medicament.

**Cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile**

- La femei, cicluri neregulate sau producere de prea multă prolactină (hormonul care stimulează producerea de lapte)
- Senzație de ostilitate sau agresivitate
- Gânduri anormale
- Mișcări de răsucire sau smucitură
- Hiperactivitate
- Indigestie
- Probleme cu funcția hepatică (aceasta se observă la analizele de sânge), inflamație a ficatului (hepatită)
- Dezechilibru al sistemului nervos. Simptomele pot include: bătăi rapide ale inimii și tensiune arterială instabilă (senzație de amețeală, stare de confuzie sau leșin)
- Reacție alergică gravă care provoacă umflare a feței sau a gâtului
- Umflare a gleznelor, picioarelor sau degetelor
- Reacție la nivelul pielii cauzată de sensibilitatea la lumina soarelui
- Dificultate la urinare sau probleme cu controlul vezicii urinare
- Creștere a presiunii din interiorul ochiului, care vă poate afecta și vederea
- Abuz de medicament.

**Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

**5. Cum se păstrează Alprazolam Grindeks**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

**MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.**

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## 6. Conținutul ambalajului și alte informații

### Ce conține Alprazolam Grindeks

Substanța activă este alprazolam.

- Alprazolam Grindeks 0,25 mg comprimate  
Fiecare comprimat conține 0,25 mg alprazolam.
- Alprazolam Grindeks 0,5 mg comprimate:  
Fiecare comprimat conține 0,5 mg alprazolam.
- Alprazolam Grindeks 1 mg comprimate:  
Fiecare comprimat conține 1 mg alprazolam.

Celelalte componente sunt lactoză monohidrat; celuloză microcristalină (E460); amidon de porumb pregelatinizat; docusat de sodiu; benzoat de sodiu (E211); stearat de magneziu (E572); dioxid de siliciu coloidal anhidru (E551), oxid roșu de fer (E172) (numai comprimatele de 0,5 mg); lac indigo carmin (E132) (numai comprimatele de 1 mg).

### Cum arată Alprazolam Grindeks și conținutul ambalajului

Alprazolam Grindeks 0,25 mg este un comprimat oval alb sau aproape alb (10 mm x 5 mm) cu o linie mediană pe o față și marcat cu „0,25” pe cealaltă față.

Alprazolam Grindeks 0,5 mg este un comprimat oval (10 mm x 5 mm) de culoare roz deschis până la roz, cu o linie mediană pe o față și marcat cu „0,5” pe cealaltă față.

Alprazolam Grindeks 1 mg este un comprimat oval (10 mm x 5 mm) de culoare albastru deschis până la albastru, cu o linie mediană pe o față și marcat cu „1” pe cealaltă față.

Alprazolam Grindeks este disponibil în cutii cu blistere din OPA-Al-PVC/Al care conțin 10, 20, 30, 50, 60 sau 100 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

### Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

AS GRINDEKS

Krustpils iela 53,

Rīga, LV-1057,

Letonia

Tel: +371 67083205

E-mail: grindeks@grindeks.com

### Acest medicament este autorizat în statele membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Germania	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Austria	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Belgia	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimés
Bulgaria	Алпразолам Гриндекс 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg таблетки Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablets
Croația	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete



Republica Cehă	Alprazolam Grindeks
Danemarca	Alprazolam Grindeks
Estonia	Ixhalanex
Finlanda	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletit
Franța	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,25 mg comprimé sécable ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,5 mg comprimé sécable ALPRAZOLAM GRINDEKS 1 mg comprimé sécable
Grecia	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg δισκία
Ungaria	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tableta
Irlanda	Alprazolam Grindeks 250 microgram, 500 microgram, 1 mg tablets
Italia	Alprazolam Grindeks
Letonia	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletes
Lituania	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletės
Luxemburg	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Pellen
Țările de Jos	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletten
Polonia	Alprazolam Grindeks
Portugalia	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
România	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimate
Slovacia	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablety
Slovenia	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Spania	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Suedia	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletter

**Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2024.**