

Produodopa

(foslevodopa/foscarbidopa)

pentru boala Parkinson avansată

GHIDUL PACIENTULUI

Acest ghid pentru pacienți conține informații importante privind siguranța pe care trebuie să le luați la cunoștință.

Vă rugăm să păstrați acest ghid disponibil atunci când vă pregătiți să utilizați acest medicament.

abbvie

De ce ar trebui să citesc acest ghid al pacientului?

Produodopa este un medicament utilizat pentru tratamentul simptomelor bolii Parkinson avansate.

Se utilizează atunci când alte medicamente nu mai funcționează la fel de bine ca înainte pentru a trata simptomele bolii.

Dumneavoastră sau persoana care vă îngrijește veți administra acest medicament sub piele printr-un tub mic de plastic (canulă) în zona din jurul buricului. Această zonă este locul de perfuzare.

Medicamentul este distribuit prin acest tub continuu 24 de ore pe zi.

Unele persoane care utilizează acest medicament pot prezenta probleme la nivelul pielii, acolo unde canula intră în corpul lor.

Acestea pot fi:

- **o infecție a pielii.** Aceasta are loc atunci când germenii intră prin piele.

O infecție a pielii poate deveni gravă atunci când germenii intră în sânge și se răspândesc în tot corpul. Aceasta se numește sepsis.

- **o reacție cutanată.** În această situație pielea devine iritată/inflamată.

Acest ghid pentru pacienți vă va ajuta pe dumneavoastră și pe persoana care vă îngrijește să aflați despre:



Cum să alegeți locul de administrare a perfuziei



Cum să recunoașteți o infecție la locul perfuziei sau o reacție la locul perfuziei



Ce puteți face pentru a reduce riscul unei infecții la locul perfuziei sau a reacției la locul de perfuzare



Ce trebuie să faceți dacă aveți o infecție la locul perfuziei sau reacție la locul perfuziei



Unde puteți găsi mai multe informații despre medicamentul dumneavoastră



Cum să alegeți locul de administrare a perfuziei

Schimbarea regulată a locului de perfuzare este importantă. Acest lucru se datorează faptului că vă ajută pielea să rămână sănătoasă și permite administrarea corectă a medicamentului.

Puteți utiliza abdomenul pentru locul perfuziei, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă spune să utilizați un alt loc. Asigurați-vă că locul pe care îl alegeți este la cel puțin 5 cm distanță (aproximativ lungimea degetului mic) de la buric.


- Evitați linia centurii, deoarece această zonă poate fi iritată de presiunea centurii împotriva pielii
- Evitați orice zonă din piele care este cicatrizată, dură sau are vergeturi
- Evitați orice pliuri sau cute unde pielea se îndoaie în mod natural foarte mult
- Utilizați un nou set de perfuzie (canulă/tub) de fiecare dată când schimbați locul perfuziei.

Schimbați locul perfuziei la fiecare 3 zile sau mai devreme, în funcție de modificările de pe piele (cum sunt roșeață, umflare și durere).

Noul loc de perfuzare trebuie să fie la cel puțin 2,5 cm (aproximativ spațiul a două degete) distanță de ultimul pe care l-ați utilizat.

După ce ați utilizat un loc de perfuzare, nu îl utilizați din nou timp de 12 zile. Acest lucru vă va ajuta pielea să se vindece complet.

Există diferite modalități de a vă ajuta să vă amintiți să nu reutilizați un loc de perfuzare prea curând. O modalitate este să vă imaginați că abdomenul dumneavoastră arată ca un ceas. Puteți introduce canula la un interval diferit de două ore de fiecare dată. Puteți începe cu locul de la ora 12, apoi ora 2, urmat de ora 4 și așa mai departe.




Notați data și locul locurilor de perfuzare pentru a vă ajuta să țineți evidența.



Cum să recunoașteți o infecție la locul perfuziei sau o reacție la locul perfuziei

Căutați modificări ale pielii în zona în care canula intră în piele. Modificările pielii pot apărea cu sau fără febră și includ:

- roșeață
- căldură la atingere
- umflare
- sensibilitate/durere
- modificări ale culorii pielii atunci când apăsați pe piele





Ce puteți face pentru a reduce riscul unei infecții la locul perfuziei sau al reacției la locul de perfuzare

Pot apărea infecții la locul perfuziei sau reacții la locul perfuziei. Mai jos sunt elemente de luat în considerare la manipularea perfuziei.



Utilizați o zonă bine luminată, curată și plată (cum ar fi o masă) pentru a vă pregăti perfuzia.



Păstrați locul de perfuzie și setul de perfuzie curate și sterile atunci când pregătiți perfuzia.



Spălați-vă întotdeauna mâinile cu apă și săpun și uscați-le cu un prosop de hârtie. Nu atingeți nimic murdar după aceea.



Evitați să lăsați vârful seringii, adaptorul flaconului, tubul sau conectorul locației să atingă o suprafață murdară.



Aruncați cu atenție oricare dintre materialele utilizate care pot fi contaminate.



După ce ați ales un loc de perfuzare, ștergeți-vă pielea cu un tampon cu alcool. Asigurați-vă că ștergeți într-o direcție, astfel încât să nu contaminați zona curățată. Lăsați zona să se usuce timp de cel puțin 1 minut.

Schimbați locul de perfuzie la fiecare 3 zile sau mai devreme, în funcție de modificările pielii (cum ar fi roseață, umflare și durere)



Când utilizați un nou loc de perfuzare, nu alegeți același loc de perfuzare timp de 12 zile. Acest lucru va ajuta pielea să se vindece complet.



Păstrați întotdeauna o distanță de 2,5 cm (aproximativ spațiul a două degete) față de ultimul loc de perfuzare utilizat.



Utilizați întotdeauna o canulă și un tub nou când treceți la un nou loc de perfuzie.



Tăiați orice păr din jurul locului de perfuzie cu foarfeca. Acest lucru va ajuta banda de canulă să se lipească de piele. Dacă trebuie să vă radeți pielea, așteptați o zi înainte de a utiliza locul de perfuzare respectiv.



Purtați haine confortabile care nu vor irita pielea la locul perfuziei.



Ce trebuie să faceți dacă aveți o infecție la locul perfuziei sau reacție la locul perfuziei

Schimbați locul perfuziei — nu așteptați 3 zile. Adresați-vă medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului dacă prezentați următoarele simptome:

- roșeață
- căldură la atingere
- umflare
- sensibilitate/durere
- modificări ale culorii pielii atunci când apăsați pe piele

Nu reutilizați un loc infectat timp de cel puțin 12 zile sau până când acesta nu s-a vindecat.



Unde puteți găsi mai multe informații despre medicamentul dumneavoastră

Pentru mai multe informații despre medicamentul dumneavoastră, consultați prospectul cu informații despre produs și instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu medicamentul dumneavoastră (foslevodopa/ foscarbidopa).

Apel la raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

011478 - Bucuresti

Fax: +4 0213 163 497

tel: + 4 021 317 11 02

e-mail: adr@anm.ro

Raportare online: <https://adr.anm.ro/>

Website: www.anm.ro

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

AbbVie România SRL,

Departamentul Farmacovigilență,

Telefon: +40215293429/ E-mail:

farmacovigilenta_romania@abbvie.com.