

Coldrex MaxGrip Lemon pulbere pentru suspensie orală
Paracetamol/Clorhidrat de fenilefrină/Acid ascorbic

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Coldrex MaxGrip Lemon pulbere pentru suspensie orală
Paracetamol 1000 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg, acid ascorbic (vitamina C) 40 mg

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare plic a 6,427 g pulbere pentru suspensie orală conține paracetamol 1000 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg, acid ascorbic (vitamina C) 40 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr.
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru suspensie orală

5 plicuri a câte 6,427 g pulbere pentru suspensie orală
10 plicuri a câte 6,427 g pulbere pentru suspensie orală
8 plicuri a câte 6,427 g pulbere pentru suspensie orală
14 plicuri a câte 6,427 g pulbere pentru suspensie orală

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Perrigo România S.R.L.
Str. Av. Popișteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park
Clădirea 2, Unitatea 3, Etaj 4, Sector 1, București, România

{Sigla Perrigo}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

10133/2017/01 - {pentru ambalajul cu 5 plicuri din hârtie/PE/Al/PE a câte 6,427 g pulbere pentru suspensie orală}
10133/2017/02 - {pentru ambalajul cu 10 plicuri hârtie/PE/Al/PE a câte 6,427 g pulbere pentru suspensie orală}
10133/2017/03 - {pentru ambalajul cu 8 plicuri hârtie/PE/Al/PE a câte 6,427 g pulbere pentru suspensie orală}
10133/2017/04 - {pentru ambalajul cu 14 plicuri hârtie/PE/Al/PE a câte 6,427 g pulbere pentru suspensie orală}
10133/2017/05 - {pentru ambalajul cu 5 plicuri hârtie/PEJD/Al/Surlyn a câte 6,427 g pulbere pentru suspensie orală}
10133/2017/06 - {pentru ambalajul cu 10 plicuri hârtie/PEJD/Al/Surlyn a câte 6,427 g pulbere pentru suspensie orală}
10133/2017/07 - {pentru ambalajul cu 8 plicuri hârtie/PEJD/Al/Surlyn a câte 6,427 g pulbere pentru suspensie orală}
10133/2017/08 - {pentru ambalajul cu 14 plicuri hârtie/PEJD/Al/Surlyn a câte 6,427 g pulbere pentru suspensie orală}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Febră
- Nas înfundat
- Dureri de cap
- Dureri în gât
- Sinuzită

Coldrex MaxGrip Lemon este folosit pentru ameliorarea simptomatică, pe termen scurt a gripei, stărilor febrile, frisoanelor și răcelilor comune, inclusiv a durerii de cap, durerilor în gât, disconfortului și durerilor la nivelul membrelor, congestiei nazale, sinuzitei precum și durerii asociate acestora.

Conține trei substanțe active: paracetamol care ameliorează durerea și reduce febra, clorhidrat de fenilefrină care este decongestionant și acid ascorbic (vitamina C), necesar în primele stadii de răceală și gripă.

Goliți conținutul unui plic într-o cană. Adăugați apă fierbinte și amestecați bine. Adăugați apă rece și zahăr sau miere, după cum doriți.

Adulți (inclusiv vârstnici) și copii cu vârsta de 12 ani și peste

A se lua un plic la fiecare 4-6 ore, fără a se depăși 4 plicuri în 24 de ore. Intervalul minim între administrări trebuie să fie de 4 ore.

Nu se utilizează mai mult de 7 zile.

A nu se administra la copii cu vârsta sub 12 ani, decât în cazul în care medicul consideră acest lucru necesar.

A nu se depăși doza recomandată.

În cazul unui supradozaj, trebuie să vă adresați imediat medicului, chiar dacă vă simțiți bine.

A nu se lua împreună cu alte medicamente pentru tuse, gripă, răceală sau decongestionante.

Conține paracetamol. A nu se lua împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol.

Dacă simptomele persistă mai mult de 3 zile, cereți sfatul medicului.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Coldrex MaxGrip Lemon

Coldrex MaxGrip Lemon pulbere pentru suspensie orală
Paracetamol/Clorhidrat de fenilefrină/Acid ascorbic

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

PLIC

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Coldrex MaxGrip Lemon pulbere pentru suspensie orală
Paracetamol 1000 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg, acid ascorbic (vitamina C) 40 mg

Administrare orală.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Goliți conținutul unui plic într-o cană. Adăugați apă fierbinte și amestecați bine.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6,427 g pulbere pentru suspensie orală

6. ALTE INFORMAȚII

- Febră
- Nas înfundat
- Dureri de cap
- Dureri în gât
- Sinuzită

Coldrex MaxGrip Lemon este folosit pentru ameliorarea simptomatică, pe termen scurt a gripei, stărilor febrile, frisoanelor și răcelilor comune, inclusiv a durerii de cap, durerilor în gât, disconfortului și durerilor la nivelul membrelor, congestiei nazale, sinuzitei precum și durerii asociate acestora.

Adulți (inclusiv vârstnici) și copii cu vârsta de 12 ani și peste

A se lua un plic la fiecare 4-6 ore în funcție de necesități, fără a se depăși 4 plicuri în 24 de ore.

Nu se administrează mai mult de 7 zile.

A nu se administra la copii cu vârsta sub 12 ani.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A nu se depăși doza recomandată.

Conține zahăr (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

{Sigla Perrigo}