

Diclac 10 mg/g gel
diclofenac sodic

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Diclac 10 mg/g gel
diclofenac sodic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram de gel conține diclofenac sodic 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

RRR- α -tocoferol (Copherol F 1300), carbomer (980 NF), oleat de decil, 2-octildodecanol (Eutanol G) lecitină (Phospholipon 80), soluție de amoniac 10%, edetat disodic, parfum "Vert de Crème", alcool izopropilic, apă purificată.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
50 g
100 g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Hexal AG
Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen
Germania

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

10461/2017/01 – ambalaj cu 50 g gel
10461/2017/02 - ambalaj cu 100 g gel

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicații terapeutice

Afecțiuni inflamatorii și traumatisme ale tendoanelor, ligamentelor, mușchilor și articulațiilor
Edeme postoperatorii și posttraumatice

Doze și mod de administrare

Dacă nu există alte recomandări din partea medicului, Diclac 10 mg/g gel se administrează extern, în strat subțire, în 2-3 aplicații pe zi la nivelul zonei afectate.

Cum trebuie utilizat Diclac 10 mg/g gel

Pentru a realiza absorbția gelului se efectuează un masaj ușor și prelungit la nivelul zonei dureroase și/sau inflamate.

După fiecare utilizare se spală mâinile.

Diclac 10 mg / g gel poate fi aplicat în asociere cu iontoforeza.

Diclac 10 mg/g gel se aplică la polul negativ (catod).

Antialgic, antiinflamator.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Diclac 10 mg/g gel

Diclac 10 mg/g gel
diclofenac sodic

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub din aluminiu

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Diclac 10 mg/g gel
diclofenac sodic
Administrare cutanată.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

50 g gel
100 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

Doze și mod de administrare

Dacă nu există alte recomandări din partea medicului, Diclac 10 mg/g gel se administrează extern, în strat subțire, în 2-3 aplicații pe zi la nivelul zonei afectate.

Cum trebuie utilizat Diclac 10 mg/g gel

Pentru a realiza absorbția gelului se efectuează un masaj ușor și prelungit la nivelul zonei dureroase și/sau inflamate

După fiecare utilizare se spală mâinile.