

Vicks AntiGrip Max 1000mg/12,2mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Clorhidrat de fenilefrină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE ȘI PLIC

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vicks AntiGrip Max 1000mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Clorhidrat de fenilefrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare plic conține:
Paracetamol 1000 mg
Clorhidrat de fenilefrină 12,2 mg (echivalent cu fenilefrină bază 10 mg)

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și:
Zahăr
Aspartam (E 951)
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru soluție orală

5 plicuri
10 plicuri

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Pentru administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

10797/2018/01- ambalaj cu 5 plicuri
10797/2018/02 - ambalaj cu 10 plicuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vicks AntiGrip Max 1000mg/12,2mg pulbere pentru soluție orală ameliorează eficient simptomele din răceală și gripă, inclusiv durerile de cap, febră, dureri ale corpului, nas înfundat, dureri în gât.

Instrucțiuni:

Dizolvați conținutul unui plic într-o cană obișnuită cu apă fierbinte, dar nu clocotită (aproximativ 250 ml). Lăsați să se răcească până la o temperatură la care poate fi consumată.

Adulți: 1 plic la fiecare 4-6 ore, dacă este necesar.

Adolescenți (cu vârsta de 16 ani și peste): 1 plic la fiecare 6 ore, dacă este necesar.

Nu luați mai mult de 4 plicuri într-un interval de 24 de ore.

Nu administrați la copii și adolescenți cu vârsta sub 16 ani.

Acest medicament trebuie utilizat numai dacă este absolut necesar.

A NU SE DEPĂȘI DOZELE RECOMANDATE.

CONȚINE PARACETAMOL. A nu se administra cu orice alte medicamente care conțin paracetamol. În caz de supradozaj, trebuie căutată imediat asistență medicală, chiar dacă vă simțiți bine.

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, luați alte medicamente, sau vă aflați sub îngrijire medicală, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Dacă simptomele persistă pentru mai mult de 5 zile sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Vicks AntiGrip Max 1000mg/12,2mg pulbere pentru soluție orală