

Reactin 10 mg capsule moi
Diclorhidrat de cetirizină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Reactin 10 mg capsule moi
Diclorhidrat de cetirizină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă moale conține diclorhidrat de cetirizină 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sorbitol (E 420) și ulei de soia. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Capsulă moale

7 capsule moi

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP: LL/AAAA

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Offices 5, 6 & 7, Block 5, High Street, Tallaght,
Dublin 24, D24 YK8N, Irlanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

10928/2018/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Reactin 10 mg capsule moi este indicat
- pentru ameliorarea simptomelor nazale și oculare ale rinitei alergice sezoniere și perene.
- pentru ameliorarea urticariei cronice (urticarie idiopatică cronică).

VÂRSTA**DOZA**

Copii cu vârsta sub 12 ani:

Nu este recomandat

Adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 12 ani:

Luați o capsulă o dată pe zi. Nu mestecați capsula.
Înghițiți capsula cu un pahar cu apă.

ATENȚIONARE: A NU SE DEPĂȘI DOZA MENȚIONATĂ

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Dacă simptomele persistă, adresați-vă medicului dumneavoastră.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Reactin 10 mg

Reactin 10 mg capsule moi
Diclorhidrat de cetirizină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister din PVC-PE-PVdC/Al

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Reactin 10 mg capsule moi
Diclorhidrat de cetirizină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

McNeil Products Ltd. {logo}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP: LL/AAAA

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII