

ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală
Acid acetilsalicilic/clorhidrat de pseudoefedrină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală
Acid acetilsalicilic/clorhidrat de pseudoefedrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare plic conține acid acetilsalicilic 500 mg și clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Granule pentru suspensie orală
10 plicuri
20 plicuri

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BAYER S.R.L.
Șos. București-Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1,
sector 1, 013681, București
România

Bayer {siglă}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11005/2018/01 – cutie cu 10 plicuri din hârtie/Al/PE cu granule pentru suspensie orală
11005/2018/02 – cutie cu 20 plicuri din hârtie/Al/PE cu granule pentru suspensie orală

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul simptomelor de răceală și/sau manifestărilor asemănătoare gripei însoțite de congestie nazală/sinusală, durere și febră.

Dacă nu se prescrie altfel, la adulți se recomandă pentru o doză: 1-2 plicuri. Doza zilnică nu trebuie să depășească 6 plicuri.

Dizolvați granulele într-un pahar cu apă fierbinte, dar nu clocotită, și amestecați bine. Se lasă să se răcească înainte de administrare.

Nu luați acest medicament mai mult de 3 zile fără să discutați cu medicul dumneavoastră.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Aspirin Complex Hot Drink

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală
Acid acetilsalicilic/clorhidrat de pseudoefedrină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR**PLIC****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ASPIRIN COMPLEX HOT DRINK 500 mg/30 mg granule pentru suspensie orală
Acid acetilsalicilic/clorhidrat de pseudoefedrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare plic conține acid acetilsalicilic 500 mg și clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Granule pentru suspensie orală
500 mg/30 mg

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BAYER S.R.L.
Șos. București-Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1,
sector 1, 013681, București
România

Bayer {siglă}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11005/2018/01 – cutie cu 10 plicuri din hârtie/Al/PE cu granule pentru suspensie orală
11005/2018/02 – cutie cu 20 plicuri din hârtie/Al/PE cu granule pentru suspensie orală

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul simptomelor de răceală și/sau manifestărilor asemănătoare gripei însoțite de congestie nazală/sinusală, durere și febră.

Adulți, pentru o doză: 1-2 plicuri. Doza zilnică nu trebuie să depășească 6 plicuri.

Dizolvați granulele într-un pahar cu apă fierbinte, dar nu clocotită, și amestecați bine. Se lasă să se răcească înainte de administrare.

Nu luați acest medicament mai mult de 3 zile fără să discutați cu medicul dumneavoastră.

Citiți prospectul înainte de utilizare.