

Proactin 10 mg comprimate
loratadină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Proactin 10 mg comprimate
loratadină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conține loratadină 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și lactoză monohidrat. A se citi prospectul înainte de utilizare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate
10 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală
1 PE ZI
TRATAMENT DE 10 ZILE

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

24 ORE

Ameliorează simptomele alergiilor:

- Strănutul
- Hipersecreția nazală
- Usturimea sau mâncărimea ochilor
- Roșeața și mâncărimea pielii

8. DATA DE EXPIRARE

Exp:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BAYER S.R.L.

Șos. București-Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
Sector 1, 013681 București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11022/2018/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Antialergic nesedativ

Indicații: Proactin este indicat în tratamentul simptomelor asociate rinitei alergice și urticariei cronice idiopatice:

- Strănutul
- Hipersecreția nazală
- Usturimea sau mâncărimea ochilor

- Roșeața și mâncărimea pielii

Adulți și adolescenți (peste 12 ani): se recomandă administrarea orală a unui comprimat Proactin 10 mg (10 mg loratadină) o dată pe zi.

Copii cu vârsta între 2 și 12 ani, cu greutate corporală > 30 kg: se recomandă administrarea orală a unui comprimat Proactin 10 mg (10 mg loratadină) o dată pe zi.

Comprimatul poate fi administrat fără legătură cu orarul meselelor.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Proactin 10 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Proactin 10 mg comprimate
loratadină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Proactin 10 mg comprimate
loratadină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{Bayer S.R.L.}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII