

DERMAZIN 10 mg/g cremă
Sulfadiazină de argint

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

DERMAZIN 10 mg/g cremă
Sulfadiazină de argint

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram cremă conține sulfadiazină de argint 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Alcool cetilic, ulei de arahide hidrogenat, p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibenzoat de propil (E 216), propilenglicol.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Cremă
25 g cremă
50 g cremă

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU
TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT)
NECESARĂ(E)**

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57, 1526 Ljubljana
Slovenia

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11071/2018/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cum să utilizați Dermazin

Înainte de aplicare, curățați și îndepărtați țesutul mort. Aplicați apoi Dermazin în strat subțire de 2-4 mm grosime; este de preferat să aplicați crema pe o fașă sterilă, pe care o plasați apoi pe leziune. Crema se aplică o dată pe zi, cu o spatulă sterilă sau cu mănuși de unică folosință. În general, crema trebuie reaplicată la interval de 24 de ore. Înainte de fiecare aplicare a cremei, leziunea se spală sub jet de soluție antiseptică sau apă pentru înlăturarea resturilor de cremă și a exsudatului cu aspect de puroi după culoare, dar aseptice în realitate, care apare din abundență după aplicarea Dermazin. Tuburile de Dermazin sunt destinate aplicării repetate pentru un singur pacient.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

DERMAZIN 10 mg/g

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

DERMAZIN 10 mg/g cremă
Sulfadiazină de argint

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

DERMAZIN 10 mg/g cremă
Sulfadiazină de argint
Uz cutanat.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

25 g
50 g

6. ALTE INFORMAȚII

{Sigla Lek Pharmaceuticals }