

Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr 8,75 mg pastile
Flurbiprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr 8,75 mg pastile
Flurbiprofen
{ Sigla S } [*de la Strepsils*]

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține flurbiprofen 8,75 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține maltitol lichid, izomalț, macrogol 300, hidroxid de potasiu, aromă de portocale (conține citral, citronelol, d-limonen, geraniol, linalool și etanol), levomentol și acesulfam potasic (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pastilă
8 pastile
16 pastile
24 pastile

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare bucofaringiană.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11
Sectorul 1, București, România

{Sigla Reckitt}

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11124/2018/01 - {pentru ambalajul cu 8 pastile}
11124/2018/02 - {pentru ambalajul cu 16 pastile}
11124/2018/03 - {pentru ambalajul cu 24 pastile}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pastilele Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr calmează rapid durerea și inflamația gâtului ce însoțesc răceala, laringita și amigdalita.

Adulți și copii peste 12 ani

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr (8,75 mg flurbiprofen) la fiecare 3-6 ore (pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi), în funcție de gravitatea simptomelor; doza maximă este de 5 pastile Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr (43,75 mg flurbiprofen) în 24 de ore.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 3 zile.

Copii

Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr nu este indicat la copii cu vârsta sub 12 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul>

Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr 8,75 mg pastile
Flurbiprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER DIN PVC-PVDC/Al

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr 8,75 mg pastile
Flurbiprofen
{ Sigla S } [*de la Strepsils*]

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII