

**Strepsils căpșuni fără zahăr pastile**  
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils căpșuni fără zahăr pastile  
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4 diclorbenzilic 1,2 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și maltitol lichid (E 965), propilenglicol (E 1520) și izomalț (E 953) (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pastilă  
1 x 12 pastile  
2 x 12 pastile

**5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare bucofaringiană.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)****8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

## 9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

## 10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

## 11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL  
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11  
Sectorul 1, București, România  
{Sigla Reckitt Benckiser}

## 12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11741/2019/01 – { 1 x 12 pastile}  
11741/2019/02 – { 2 x 12 pastile}

## 13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

## 14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## 15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Strepsils căpșuni fără zahăr aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.  
Strepsils căpșuni fără zahăr se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.  
Medicament antiseptic pentru calmarea durerilor în gât.  
Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.  
Efect antibacterian, antifungic și antiviral  
Copii 6+ ani și adulți

Mod de administrare:

Adulți și copii cu vârsta peste 6 ani

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils căpșuni fără zahăr la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un interval de 24 de ore; pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile.

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

## 16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Strepsils căpșuni fără zahăr}

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Strepsils căpșuni fără zahăr pastile**  
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ  
BLISTER DIN Al/PVC-PVDC**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils căpșuni fără zahăr pastile  
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. ALTE INFORMAȚII**