

**Pacid 20 mg comprimate gastrorezistente**  
pantoprazol**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**Pacid 20 mg comprimate gastrorezistente  
pantoprazol**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat gastrorezistent conține pantoprazol 20 mg (echivalent cu pantoprazol sodic sesquihidrat 22,56 mg)

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR****4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat gastrorezistent

1 x 7 comprimate gastrorezistente  
2 x 7 comprimate gastrorezistente**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare orală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)****8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Terapia SA  
Str. Fabricii nr.124, Cluj-Napoca, România  
{sigla Terapia- a SUN PHARMA company}  
{sigla SUN PHARMA}

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

1 x 7 comprimate gastrorezistente: 11749/2019/01  
2 x 7 comprimate gastrorezistente: 11749/2019/02

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Pacid este indicat în tratamentul de scurtă durată al simptomelor de reflux (arsuri în capul pieptului-pirozis, regurgitare de acid) la adulți.  
Refluxul reprezintă fluxul invers de acid din stomac în esofag („gât”), care poate deveni inflamă și dureros. Acesta vă poate produce simptome cum ar fi senzația dureroasă de arsură la nivelul pieptului cu tendință ascendentă înspre gât (pirozis) și un gust acru în gură.

Mod de administrare

Doza uzuală este de un comprimat pe zi, înghițit întreg cu lichid, înainte de masă. Nu depășiți doza zilnică recomandată de 20 mg pantoprazol.

Trebuie să luați acest medicament cel puțin 2-3 zile consecutiv pentru ameliorarea simptomelor.

Oprți administrarea de Pacid după dispariția completă a simptomelor.

Nu utilizați Pacid comprimate gastrorezistente mai mult de 4 săptămâni fără să vă adresați medicului dumneavoastră.

Pacid nu trebuie utilizat de copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Pacid 20 mg

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Pacid 20 mg comprimate gastrorezistente**  
pantoprazol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**BLISTER**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Pacid 20 mg comprimate gastrorezistente  
pantoprazol

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

{sigla Terapia- a SUN PHARMA company}

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. ALTE INFORMAȚII**