

FERVEX “pentru copii” fără zahăr 280 mg/100 mg/10 mg granule pentru soluție orală
Paracetamol/acid ascorbic/maleat de feniramină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE DE CARTON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

FERVEX “pentru copii” fără zahăr 280 mg/100 mg/10 mg granule pentru soluție orală
Paracetamol/acid ascorbic/maleat de feniramină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE

Fiecare plic cu granule pentru soluție orală conține paracetamol 280 mg, acid ascorbic 100 mg și maleat de feniramină 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipient cu efect cunoscut: galben amurg FCF (E 110) ; vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Granule pentru soluție orală

8 plicuri
12 plicuri
16 plicuri

5. MODUL ȘI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

UPSA SAS
3 rue Joseph Monier,
92500, Rueil Malmaison,
Franța

{sigla}

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11888/2019/01 - pentru ambalajul cu 8 plicuri
11888/2019/02 - pentru ambalajul cu 12 plicuri
11888/2019/03 - pentru ambalajul cu 16 plicuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Răceli comune

Rinite

Stări gripale

Indicații terapeutice: Tratamentul simptomatic al răcelilor comune, rinitelor alergice și vasomotorii, stărilor gripale (pentru ameliorarea strănutului, secreției nazale apoase, inflamației mucoaselor nazală și sinusală, febrei, durerilor de cap și musculare).

Doze și mod de administrare:

Copii cu vârsta între 6 și 10 ani: 1 plic Fervex “pentru copii” fără zahăr de 2 ori pe zi.

Copii cu vârsta între 10 și 12 ani: 1 plic Fervex “pentru copii” fără zahăr de 3 ori pe zi.

Copii cu vârsta între 12 și 15 ani: 1 plic Fervex “pentru copii” fără zahăr de 4 ori pe zi.

Plicurile se administrează cu o cantitate suficientă de apă rece sau fierbinte.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

FERVEX PENTRU COPII

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

FERVEX “pentru copii” fără zahăr 280 mg/100 mg/10 mg granule pentru soluție orală
Paracetamol/acid ascorbic/maleat de feniramină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Plic

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

FERVEX “pentru copii” fără zahăr 280 mg/100 mg/10 mg granule pentru soluție orală
Paracetamol/acid ascorbic/maleat de feniramină
Administrare orală.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

3 g granule pentru soluție orală

6. ALTE INFORMAȚII

Răceli comune
Rinite
Stări gripale

{ sigla }