

KAMISTAD 20 mg + 185 mg/g gel**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

KAMISTAD 20 mg + 185 mg/g gel

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

100 g gel conțin clorhidrat de lidocaină 2 g, extract lichid de mușețel (1:4-5; solvent de extracție: etanol 50% v/v cu 1,37% trometamol m/m) 18,50 g.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Clorură de benzalconiu, sol 50%, ulei volatil de scorțișoară, zaharină sodică, carbomer, trometamol, acid formic anhidru 98%, etanol 96%, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTULGel
Un tub a 10 g gel**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**A se citi prospectul înainte de utilizare.
Bucofaringiana**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Exp:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Germania

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

11997/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Nu conține zahăr.

Este utilizat pentru infecțiile ușoare ale gingiei și mucoasei bucale.

Doze și mod de administrare: Pentru tratamentul gingivitei și al disconfortului produs de protezele dentare, se aplică *Kamistad Gel* la nivelul zonelor inflamate sau dureroase și se masează ușor.

Se aplică de trei ori pe zi câte ½ cm gel *Kamistad Gel*.

La sugari și copii mici nu trebuie depășită doza de ½ cm gel *Kamistad Gel* de 3 ori pe zi, în 24 ore.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Kamistad

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

KAMISTAD 20 mg + 185 mg/g gel

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

Tub

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

KAMISTAD 20 mg + 185 mg/g gel

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

100 g gel conțin clorhidrat de lidocaină 2 g, extract lichid de mușețel (1:4-5; solvent de extracție: etanol 50% v/v cu 1,37% trometamol m/m) 18,50 g.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Clorură de benzalconiu, sol 50%, ulei volatil de scorțișoară, zaharină sodică, carbomer, trometamol, acid formic anhidru 98%, etanol 96%, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
Un tub a 10 g gel

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Bucofaringiana

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Exp:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Nu conține zahăr.

Este utilizat pentru infecțiile ușoare ale gingiei și mucoasei bucale.

Doze și mod de administrare: Pentru tratamentul gingivitei și al disconfortului produs de protezele dentare, se aplică *Kamistad Gel* la nivelul zonelor inflamate sau dureroase și se masează ușor.

Se aplică de trei ori pe zi câte ½ cm gel *Kamistad Gel*.

La sugari și copii mici nu trebuie depășită doza de ½ cm gel *Kamistad Gel* de 3 ori pe zi, în 24 ore.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE