

**Sanador pentru copii 150 mg/5 ml soluție orală  
paracetamol**

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR  
CUTIE**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Sanador pentru copii 150 mg/5 ml soluție orală  
paracetamol

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

5 ml soluție orală pentru copii conțin paracetamol 150 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și: zahăr, p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibenzoat de propil (E 216). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Soluție orală.  
Un flacon a 100 ml și seringă dozatoare.

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE  
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se utiliza în maxim 30 zile după prima deschidere a flaconului.

#### **9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalaj original.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

#### **11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

S.C. Laropharm S.R.L.

Șos. Alexandriei nr.145 A, Bragadiru, Ilfov

România

e-mail: [ra@laropharm.ro](mailto:ra@laropharm.ro)

#### **12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

12213/2019/01

#### **13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

#### **14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

#### **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Indicații:

- tratamentul eficient al durerilor de intensitate ușoară până la moderată, de exemplu dureri dentare, dureri de cap, dureri în gât.

- scăderea febrei asociate diferitelor afecțiuni – răceală, stări gripale, boli infecto-contagioase ale copilăriei (pojar, tuse convulsivă, oreion și vărsat de vânt), afecțiuni ORL, febră după vaccinare.

Este indicat copiilor cu vârste cuprinse între 0 luni și 12 ani.

Dozarea este dependentă de greutatea corporală: 10 - 15 mg /kg corp/doză, 3 - 4 doze pe zi.

Dacă nu se cunoaște greutatea corporală a pacientului, doza se poate stabili în funcție de vârstă.

Vârsta	Doza
0-3 luni	2 ml (60 mg paracetamol), după vaccinarea de la 2 luni, numai la recomandarea medicului
3 luni – 12 luni	2 - 4 ml (60 – 120 mg paracetamol)
1 an – 6 ani	4 - 8 ml (120 – 240 mg paracetamol)
6 ani – 12 ani	8 - 16 ml (240 – 480 mg paracetamol)

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Sanador pentru copii 150 mg/5 ml

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul

**Sanador pentru copii 150 mg/5 ml soluție orală  
paracetamol**

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE  
MICI**

**ETICHETA PENTRU FLACON**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE  
ADMINISTRARE**

Sanador pentru copii 150 mg/5 ml soluție orală  
paracetamol  
Administrare orală

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.  
A se utiliza în maxim 30 zile după prima deschidere a flaconului.

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

100 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

Sigla SC Laropharm SRL