

**ACC Junior 100 mg/plic pulbere pentru soluție orală**  
Acetilcisteină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**  
Cutie**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ACC Junior 100 mg/plic pulbere pentru soluție orală  
Acetilcisteină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare 3 g (1 plic) pulbere pentru soluție orală conțin acetilcisteină 100 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și zahăr  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală  
20 plicuri unidoză

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare orală

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Atenționare pentru pacienții cu diabet zaharat: 3 g (1 plic) pulbere pentru soluție orală conțin carbohidrați 0,24 unități de pâine (2,83 mg zahăr)

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se păstra la temperaturi peste 30° C

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

HEXAL AG, Industriestrasse 25,  
D-83607 Holzkirchen, Germania

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

1239/2008/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

ACC Junior pulbere pentru soluție orală fluidifică mucusul vâscos în cazul afecțiunilor tractului respirator: laringită, sinuzită acută și cronică, otită medie.

ACC pulbere pentru soluție orală facilitează tusea și expectorația secrețiilor în cazul afecțiunilor respiratorii acute și cronice acompaniate de tulburări în formarea și transportul mucusului: bronșită acută, bronșită astmatiformă, în acutizările bronho-pneumopatiei cronice, bronșiectazii, mucoviscidoză, astm bronșic.

Dacă nu este altfel prescris, sunt recomandate următoarele doze zilnice:

Copii cu vârsta sub 2 ani:

Administrați ACC Junior 100 mg/plic, pulbere pentru soluție orală la copiii cu vârsta sub 2 ani numai la recomandarea medicului, deoarece nu există suficientă experiență cu privire la administrarea acetilcisteinei la această grupă de vârstă.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani:

Un plic de 2-3 ori pe zi (echivalent cu 200-300 mg acetilcisteină)

Copii și adolescenți cu vârsta între 6-14 ani

Un plic de 3-4 ori pe zi (echivalent cu 300-400 mg acetilcisteină)

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani

2 plicuri de 2-3 ori pe zi (echivalent cu 400-600 mg acetilcisteină)

Mod de administrare și durata administrării

ACC Junior pulbere pentru soluție orală se administrează după mese.

Vă rugăm să dizolvați pulberea într-un pahar cu apă și să beți în totalitate conținutul paharului.

Dacă simptomele dumneavoastră se agravează sau nu se ameliorează după 4-5 zile, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră.

În bronșita cronică și mucoviscidoză este necesar un tratament de lungă durată în scop profilactic.

<b>16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE</b>
----------------------------------

ACC Junior 100 mg/plic pulbere pentru soluție orală

**ACC Junior 100 mg/plic pulbere pentru soluție orală**  
Acetilcisteină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**Plic**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

ACC Junior 100 mg/plic pulbere pentru soluție orală  
Acetilcisteină

Uz oral

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

100 mg

**6. ALTE INFORMAȚII**

{Sigla Sandoz}