

ROBITUSSIN EXPECTORANS 100 mg/5 ml soluție orală
Guaifenezină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie din carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUIRobitussin Expectorans 100 mg / 5 ml soluție orală
Guaifenezină**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE**

5 ml soluție orală conțin 100 mg guaifenezină

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți cu efect cunoscut: etanol 96% v/v, maltitol lichid (E965), sorbitol soluție 70% (E420), benzoat de sodiu.

A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTULSoluție orală
100 ml**5. MODUL ȘI CĂLEA DE ADMINISTRARE**Administrare orală
Doza recomandată este:Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani: 10-20 ml la fiecare 4 ore
Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani: 5-10 ml la fiecare 4 ore
Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani: 2,5-5 ml la fiecare 4 ore.

Adresați-vă medicului înainte de utilizare.

Robitussin Expectorans nu se administrează la copiii cu vârsta sub 2 ani.
Nu depășiți doza recomandată.

Oprțiți tratamentul cu Robitussin Expectorans și întrebați medicul dacă tusea durează mai mult de 5 zile (3 zile la copii), recidivează sau este însoțită de febră, alergii sau dureri persistente de cap. Acestea ar putea fi semne ale unor afecțiuni severe.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ ATENȚIONARE SPECIALĂ, DACĂ ESTE NECESARĂ

Nu utilizați acest medicament dacă observați că sigiliul capacului este deteriorat.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 12 luni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.,
Str. Costache Negri nr. 1-5,
Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12448/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Robitussin Expectorans este un expectorant care ajută la eliberarea sputei (mucusului) și fluidifică secrețiile bronhice pentru a face tusea mai productivă și ameliorează simptomele congestiei pulmonare la adulți și copii cu vârsta peste 2 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Robitussin Expectorans

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

ROBITUSSIN EXPECTORANS 100 mg/5 ml soluție orală
Guaifenezină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR****Etichetă de flacon****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Robitussin Expectorans 100 mg / 5 ml soluție orală
Guaifenezină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE

5 ml soluție orală conțin 100 mg guaifenezină

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți cu efect cunoscut: etanol 96% v/v, maltitol lichid (E965), sorbitol soluție 70% (E420), benzoat de sodiu.

A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție orală
100 ml

5. MODUL ȘI CĂLEA DE ADMINISTRARE

Administrare orală

Doza recomandată este:

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani: 10-20 ml la fiecare 4 ore

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani: 5-10 ml la fiecare 4 ore

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani: 2,5-5 ml la fiecare 4 ore.

Adresați-vă medicului înainte de utilizare.

Robitussin Expectorans nu se administrează la copiii cu vârsta sub 2 ani.

Nu depășiți doza recomandată.

Opriți tratamentul cu Robitussin Expectorans și întrebați medicul dacă tusea durează mai mult de 5 zile (3 zile la copii), recidivează sau este însoțită de febră, alergii sau dureri persistente de cap. Acestea ar putea fi semne ale unor afecțiuni severe.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ ATENȚIONARE SPECIALĂ, DACĂ ESTE NECESARĂ

Nu utilizați acest medicament dacă observați că sigiliul capacului este deteriorat.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 12 luni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.,
Str. Costache Negri nr. 1-5,
Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București, România

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12448/2019/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Robitussin Expectorans este un expectorant care ajută la eliberarea sputei (mucusului) și fluidifică secrețiile bronhice pentru a face tusea mai productivă și ameliorează simptomele congestiei pulmonare la adulți și copii cu vârsta peste 2 ani.