

Daleron 500 mg comprimate
Paracetamol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Daleron 500 mg comprimate
Paracetamol

Pentru febră și durere

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conține paracetamol 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și cazein formaldehidă
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate

12 comprimate
20 comprimate
60 comprimate
90 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12807/2019/01-04

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Daleron comprimate este utilizat pentru ameliorarea durerilor de intensitate ușoară-moderată, cum sunt: dureri de cap, dureri de dinți, durere menstruală, durere de mușchi și durere reumatică, durerea după traumatisme, proceduri medicale și dentare. În răceală și gripă, Daleron comprimate ameliorează durerea musculară și articulară și scade febra ce însoțește variate infecții bacteriene și virale.

Doza recomandată pentru adulți și copiii cu vârsta peste 12 ani este de 1 până la 2 comprimate, iar pentru copiii de la 6 ani până la 12 ani, de ½ comprimat până la 1 comprimat. Doza poate fi repetată de 4 ori pe zi. Intervalul de administrare trebuie să fie de cel puțin 4 ore. Nu trebuie să luați mai mult de 8 comprimate pe zi, iar copiii cu vârsta de la 6 până la 12 ani nu trebuie să ia mai mult de 4 comprimate în 24 ore.

Nu trebuie să depășiți dozele recomandate.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Daleron 500 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Daleron 500 mg comprimate
Paracetamol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Daleron 500 mg comprimate
Paracetamol

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIATĂ

KRKA

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. ALTE INFORMAȚII