

**PROTECARDIN 75 mg comprimate gastrorezistente**  
Acid acetilsalicilic**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**PROTECARDIN 75 mg comprimate gastrorezistente  
Acid acetilsalicilic**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un comprimat gastrorezistent conține acid acetilsalicilic 75 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și lactoză monohidrat. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**Comprimat gastrorezistent  
40 comprimate gastrorezistente**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare orală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMANA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONĂRE(ĂRI) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)****8. DATA DE EXPIRARE**EXP  
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

## 9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

## 10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ÎNDEPĂRTAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

## 11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BIOFARM S.A.  
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, Sector 3, București, România  
Telefon: 021 30.10.600  
Fax: 021 30.10.605  
E-mail: [office@biofarm.ro](mailto:office@biofarm.ro)

{Sigla BIOFARM}

## 12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12832/2019/01- ambalaj cu 2 blistere din PVC/Al  
12832/2019/02- ambalaj cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al

## 13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

## 14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## 15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Protecardin 75 mg previne formarea de cheaguri de sânge. Este util pacienților care au avut un infarct miocardic, un accident vascular cerebral, au suferit o intervenție asupra inimii și/sau vaselor de sânge (chirurgie vasculară, angioplastie coronariană transluminală percutană, by-pass coronarian), precum și în cazul celor care au angină pectorală (cunoscută și sub denumirea de cardiopatie ischemică cronică dureroasă).

Trebuie să cereți sfatul medicului dumneavoastră înainte de a lua pentru prima dată Protecardin 75 mg, pentru a fi sigur că urmați tratamentul adecvat situației Dumneavoastră.

**Important:** acest medicament nu este destinat tratamentului durerilor sau febrei.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

{PROTECARDIN 75 mg}

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul

**PROTECARDIN 75 mg comprimate gastrorezistente**  
Acid acetilsalicilic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ  
BLISTERE din PVC/Al și din PVC-PVDC/Al**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

PROTECARDIN 75 mg comprimate gastrorezistente  
Acid acetilsalicilic

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

{Sigla BIOFARM}

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie

**5. ALTE INFORMAȚII**