

EPICOGEL 405 mg/100 mg/125 mg/ 5 ml suspensie orală**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EPICOGEL 405 mg/100 mg/125 mg/ 5 ml suspensie orală
hidroxid de aluminiu, hidroxid de magneziu, simeticonă

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

5 ml suspensie orală conțin hidroxid de aluminiu gel uscat 405,00 mg, hidroxid de magneziu 100 mg, simeticonă 125,00 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sorbitol, p-hidroxibenzoat de metil sodic (E 219) și p-hidroxibenzoat de n-propil sodic (E 217) .
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Suspensie orală

Un flacon a 125 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

Exp:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

E.I.P.I.CO MED S.R.L.

B-dul Unirii nr. 6, Bl. 8C sc.1, etj. 3, ap 9

Sector 4, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12939/2020/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A se agita flaconul înainte de utilizare

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

epicogel

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

EPICOGEL 405 mg/100 mg/125 mg/ 5 ml suspensie orală

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
ETICHETA FLACONULUI**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EPICOGEL 405 mg/100 mg/125 mg/ 5 ml suspensie orală
hidroxid de aluminiu gel uscat, hidroxid de magneziu, simeticonă

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{E.I.P.I.CO MED S.R.L.}

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII

125 ml

A se agita înainte de întrebuințare.

Administrare orală