

PARAREMIN comprimate
paracetamol/propifenazonă/cafeină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PARAREMIN comprimate
paracetamol/propifenazonă/cafeină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conține paracetamol 250 mg, propifenazonă 150 mg, cafeină 50 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate
10 comprimate
20 comprimate
30 comprimate
1000 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Ambalaj de uz spitalicesc (pentru ambalajul de 1000 comprimate)

A nu se lua împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

POLISANO PHARMACEUTICALS S.R.L.S.A.
Șos. Alba Iulia nr 156, cod 550052, Sibiu, jud Sibiu, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

12994/2020/01- ambalaj cu 10 comprimate
12994/2020/02- ambalaj cu 20 comprimate
12994/2020/03- ambalaj cu 30 comprimate
12994/2020/04- ambalaj cu 1000 comprimate (ambalaj de uz spitalicesc)

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Reduce durerea și febra

Pararemin este un medicament indicat pentru:

-tratamentul durerilor ușoare și medii cu diferite localizări, precum cefaleea, durerea de dinți, durerea menstruală, durerea reumatică.

-tratamentul durerii și febrei asociate cu răceala și gripa.

Administrare:

Adulți (inclusiv vârstnici), adolescenți și copii cu vârsta peste 16 ani:

Doza recomandată este de 1-2 comprimate Pararemin o dată. La nevoie, doza se poate repeta de 3 ori în 24 de ore. Doza maximă zilnică este de 6 comprimate.

Copii cu vârsta cuprinsă între 12 – 16 ani:

Doza recomandată este de 1 comprimat Pararemin o dată.

La nevoie, doza se poate repeta de 3 ori în 24 de ore.

Copii cu vârsta sub 12 ani:

Acest medicament nu este indicat la copii cu vârsta sub 12 ani.

Pararemin se administrează pe cale orală, cu o cantitate suficientă de lichid (aproximativ 200 ml la adult, dacă este posibil).

Nu depășiți dozele recomandate. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă după 3 zile simptomele nu se ameliorează.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

PARAREMIN

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

PARAREMIN comprimate
paracetamol/propifenazonă/cafeină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PARAREMIN comprimate
paracetamol/propifenazonă/cafeină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{POLISANO PHARMACEUTICALS}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII