

**Strepsils Intensiv Miere și Lămâie 8,75 mg/ doză spray bucofaringian, soluție**  
Flurbiprofen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**Cutie**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Intensiv Miere și Lămâie 8,75 mg/ doză spray bucofaringian, soluție  
Flurbiprofen

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

O doză (3 pulverizări) conține flurbiprofen 8,75 mg

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Betadex, fosfat disodic dodecahidrat, acid citric monohidrat, parahidroxibenzoat de metil (E218), parahidroxibenzoat de propil (E216), hidroxid de sodiu, aromă de miere, aromă de lămâie, N-2,3-trimetil-2-izopropil butanamidă, zaharină sodică, hidroxipropilbetadex, apă purificată.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Spray bucofaringian, soluție  
15 ml (aprox. 83 puf-uri)

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare bucofaringiană.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Pentru utilizare la adulți.

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

A nu se utiliza mai mult de 6 luni de la prima deschidere

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se ține în frigider și a nu se congela.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

Nu este cazul.

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Reckitt Benckiser (România) S.R.L.  
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower  
Etaj 11, Sector 1, București, România

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

13092/2020/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Pentru tratamentul rapid și eficient al durerilor în gât.

- Analgezic
- Antiinflamator
- Efectul durează până la 6 ore

Ameliorează durerea în gât în 5 minute.

**Adulți cu vârsta peste 18 ani:** o doză (3 puf-uri) administrată în partea din spate a gâtului la fiecare 3-6 ore, la nevoie. Nu administrați mai mult de 5 doze în 24 de ore.  
Nu utilizați mai mult de 3 zile. Nu inhalați în timpul administrării.

**A se citi prospectul înainte de utilizare.**

<b>16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE</b>
----------------------------------

Strepsils Intensiv Miere și Lămâie 8,75 mg spray

<b>17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL</b>
---

Nu este cazul.

<b>18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE</b>
---

Nu este cazul.

**Strepsils Intensiv Miere și Lămâie 8,75 mg/ doză spray bucofaringian, soluție  
Flurbiprofen**

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE  
MICI**

**Flacon**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE  
ADMINISTRARE**

Strepsils Intensiv Miere și Lămâie 8,75 mg/ doză spray bucofaringian, soluție  
Flurbiprofen

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare bucofaringiană

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

A nu se utiliza mai mult de 6 luni de la prima deschidere

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

15 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ:

13092/2020/01

DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ:

Reckitt Benckiser (România) S.R.L.