

Coldact 500 mg comprimate
Paracetamol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Coldact 500 mg comprimate
Paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Un comprimat conține paracetamol 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat

10 comprimate - {1 blister x 10 comprimate}

20 comprimate - {2 blistere x 10 comprimate}

30 comprimate - {3 blistere x 10 comprimate}

20 comprimate - {1 blister x 20 comprimate}

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A nu se lua împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

VITEMA S.A.

Șos. Alba Iulia, nr 156, Sibiu, jud. Sibiu, cod 550052, România

{Sigla Terapia}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13098/2020/01-02-03-04

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

COLDACT este indicat în tratamentul simptomatic al durerilor ușoare și moderate cu diferite localizări (cap•gât•dinți•mușchi•articulații•dureri asociate răcelii și gripei•dureri menstruale) și tratamentul simptomatic al febrei.

Reduce temperatura în caz de febră.

Ameliorează durerea.

Adulți și copii cu vârsta peste 15 ani

1-2 comprimate o dată, la fiecare 4-6 ore, maxim 8 comprimate în decurs de 24 de ore.

Copii între 12 și 15 ani:

1 comprimat o dată, maxim 3-4 comprimate în decurs de 24 de ore.

Copii între 6 și 12 ani:

Doza recomandată este de 60 mg paracetamol/kg, divizată în mai multe prize a câte 10-15 mg/kg pe priză.

Nu se va administra copiilor mai mult de 3 zile fără întrerupere. A nu se administra la intervale mai mici de 4 ore.

A nu se administra la copii cu vârsta sub 6 ani.

A nu se depăși doza recomandată.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{coldact 500 mg}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Coldact 500 mg comprimate
Paracetamol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER din PVC/Al

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Coldact 500 mg comprimate
Paracetamol

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII