

**ACC lămâie și miere 200 mg pulbere pentru soluție orală în plic**  
Acetilcisteină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**Cutie**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ACC lămâie și miere 200 mg pulbere pentru soluție orală în plic  
Acetilcisteină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Fiecare plic cu 3 g pulbere conține acetilcisteină 200 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține zahăr și sodiu. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală în plic  
20 plicuri a 3 g pulbere pentru soluție orală

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare orală.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Atenționare pentru diabetici  
1 plic cu 3 g pulbere conține 0,21 unități de carbohidrați.

**8. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.  
Soluția este stabilă timp de 3 ore după reconstituirea în apă fierbinte.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Hexal AG  
Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Germania

**12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

13385/2020/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****Pentru ce se utilizează ACC lămâie și miere 200 mg**

Acetilcisteina este indicată ca terapie mucolitică în afecțiuni respiratorii (bronșită acută, bronșiectazii, bronșita cronică și acutizările acesteia, mucoviscidoză) caracterizate de hipersecreție densă și vâscoasă.

Dacă nu este altfel prescris de către medicul dumneavoastră, doza uzuală este:

**Copii cu vârsta sub 2 ani**

Datorită cantității mari de substanță activă ACC lămâie și miere nu trebuie utilizat la copiii cu vârsta sub 2 ani.

**Copii cu vârsta între 2-5 ani**

½ plic de 2-3 ori pe zi (echivalent cu 200-300 mg acetilcisteină/zi).

**Copii cu vârsta între 6-14 ani**

1 plic de 2 ori pe zi (echivalent cu 400 mg acetilcisteină/zi).

**Adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani**

1 plic de trei ori pe zi (echivalent cu 600 mg acetilcisteină).

**Modul de administrare și durata tratamentului:**

Luați ACC lămâie și miere după mese. Dizolvați pulberea într-un pahar cu apă fierbinte și beți întregul conținut al paharului, cât de fierbinte puteți.

Dacă simptomele dumneavoastră se agravează sau nu se ameliorează după 4-5 zile, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră.  
În cazul bronșitei cronice și al mucoviscidozei tratamentul trebuie continuat pe o perioadă mai lungă de timp pentru a realiza profilaxia infecției.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

ACC lămâie și miere 200 mg

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**ACC lămâie și miere 200 mg pulbere pentru soluție orală în plic**  
Acetilcisteină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**Plic**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ACC lămâie și miere 200 mg pulbere pentru soluție orală în plic  
Acetilcisteină

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

{Hexal AG}/Logo Sandoz

**3. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. ALTE INFORMAȚII**