

**Cebangin mentol 2 mg/0,5 mg/ml, spray bucofaringian, soluție
digluconat de clorhexidină soluție / clorhidrat de lidocaină**

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Cebangin mentol 2 mg/0,5 mg/ml, spray bucofaringian, soluție
digluconat de clorhexidină soluție / clorhidrat de lidocaină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

O doză eliberată = un puf, corespunde la 85 μ l soluție, care conține 0,90 mg digluconat de clorhexidină soluție (echivalent la 0,17 mg digluconat de clorhexidină) și 0,04 mg clorhidrat de lidocaină monohidrat.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Acid citric monohidrat, glicerol, zaharină sodică (E954), levomentol, cineol, etanol, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Spray bucofaringian, soluție
Un flacon a 30 ml spray bucofaringian

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare bucofaringiană

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Pentru medicamentul ambalat pentru comercializare - A se păstra la temperaturi sub 25°C.
După deschiderea flaconului – A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

CEBIS International SRL România
Calea Plevnei, nr. 222, sector 6, 060016, București, România

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

13623/2020/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tratament simptomatic în cazul infecțiilor orofaringiene: dureri în gât asociate cu răceli, faringite sau laringite, stomatite, afte, gingivite.

Doze

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: 3-5 pufuri o dată, de 6-10 ori pe zi

Copii cu vârsta peste 6 ani: 2-3 pufuri o dată, de 3-5 ori pe zi

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Cebangin mentol 2 mg/0,5 mg/ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

**Cebangin mentol 2 mg/0,5 mg/ml, spray bucofaringian, soluție
digluconat de clorhexidină soluție / clorhidrat de lidocaină**

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE
MICI**

Etichetă de flacon

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE
ADMINISTRARE**

Cebangin mentol 2 mg/0,5 mg/ml, spray bucofaringian, soluție
digluconat de clorhexidină soluție / clorhidrat de lidocaină
Administrare bucofaringiană

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

30 ml

6. ALTE INFORMAȚII

{CEBIS International SRL România}