

**Cebangin lămâie 2 mg/0,5 mg/ml, spray bucofaringian, soluție**  
digluconat de clorhexidină soluție / clorhidrat de lidocaină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Cebangin lămâie 2 mg/0,5 mg/ml, spray bucofaringian, soluție  
digluconat de clorhexidină soluție / clorhidrat de lidocaină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

O doză eliberată = un puf, corespunde la 85μl soluție, care conține 0,90 mg digluconat de clorhexidină soluție (echivalent la 0,17 mg digluconat de clorhexidină) și 0,04 mg clorhidrat de lidocaină monohidrat.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Aromă de lămâie CRA158L, sucraloză (E955), glicerol, propilenglicol, acid citric monohidrat, etanol, apă purificată.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Spray bucofaringian, soluție  
Un flacon a 30 ml spray bucofaringian

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare bucofaringiană

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)****8. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

Pentru medicamentul ambalat pentru comercializare - A se păstra la temperaturi sub 25°C.  
După deschiderea flaconului – A se păstra la temperaturi sub 25°C.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

CEBIS International SRL România  
Calea Plevnei, nr. 222, sector 6, 060016, București, România

**12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

13624/2020/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Tratament simptomatic în cazul infecțiilor orofaringiene: dureri în gât asociate cu răceli, faringite sau laringite, stomatite, afte, gingivite.

**Doze**

*Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani:* 3-5 pufuri o dată, de 6-10 ori pe zi

*Copii cu vârsta peste 6 ani:* 2-3 pufuri o dată, de 3-5 ori pe zi

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Cebangin lămâie 2 mg/0,5 mg/ml

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Cebangin lămâie 2 mg/0,5 mg/ml, spray bucofaringian, soluție  
digluconat de clorhexidină soluție / clorhidrat de lidocaină**

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE  
MICI**

**Etichetă de flacon**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE  
ADMINISTRARE**

Cebangin lămâie 2 mg/0,5 mg/ml, spray bucofaringian, soluție  
digluconat de clorhexidină soluție / clorhidrat de lidocaină  
Administrare bucofaringiană

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

**3. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

30 ml

**6. ALTE INFORMAȚII**

{CEBIS International SRL România}