

**Prosinus 600 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală în plic**  
paracetamol / clorhidrat de fenilefrină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Prosinus 600 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală în plic  
paracetamol / clorhidrat de fenilefrină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE**

Un plic unidoză de 4 g cu pulbere pentru soluție orală conține paracetamol 600 mg și clorhidrat de fenilefrină 12,2 mg (echivalent la fenilefrina bază 10 mg).

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și zahăr, aspartam (E951), sodiu. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală în plic  
5 plicuri a 4 g  
10 plicuri a 4 g  
15 plicuri a 4 g  
20 plicuri a 4 g

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare orală

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original pentru a fi ferit de umiditate.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Fiterman Pharma S.R.L.  
Str. Moara de Foc nr. 35, 700520, Iași, România  
{Sigla FITERMAN PHARMA}

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

14047/2021/01-02-03-04

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Adulți (inclusiv vârstnici) și copii de 12 ani și peste:

Se recomandă administrarea conținutului unui plic la fiecare 4-6 ore. Nu trebuie administrate mai mult de 5 plicuri în 24 ore. Medicamentul nu trebuie utilizat mai mult de 3 zile, fără recomandarea medicului.

Modul de administrare:

Conținutul unui plic se dizolvă într-o cană cu apă fierbinte (aproximativ 250 ml) și se bea când ajunge la o temperatură optimă.

Tratează simptome de răceală și gripă, inclusiv:

- dureri de cap
- dureri faringiene
- dureri musculare
- congestie nazală
- febră și frisoane

Aromă de lămâie

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

{Prosinus 600 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală}

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Prosinus 600 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală în plic**  
paracetamol / clorhidrat de fenilefrină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**  
**Plic**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Prosinus 600 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală în plic  
paracetamol / clorhidrat de fenilefrină  
Administrare orală

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

Adulți (inclusiv vârstnici) și copii de 12 ani și peste:

Se recomandă administrarea conținutului unui plic la fiecare 4-6 ore. Nu trebuie administrate mai mult de 5 plicuri în 24 ore. Medicamentul nu trebuie utilizat mai mult de 3 zile, fără recomandarea medicului.

Conținutul unui plic se dizolvă într-o cană cu apă fierbinte (aproximativ 250 ml) și se bea când ajunge la o temperatură optimă.

**3. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

4 g

**6. ALTE INFORMAȚII**

Fiterman Pharma S.R.L.  
Str. Moara de Foc nr. 35, 700520, Iași, România  
{ Sigla FITERMAN PHARMA }

Tratează simptome de răceală și gripă, inclusiv:

- dureri de cap
- dureri faringiene
- dureri musculare
- congestie nazală
- febră și frisoane

Aromă de lămâie