

Mobilat Pro 100 mg/g gel
naproxen

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Mobilat Pro 100 mg/g gel
naproxen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

1 g de gel conține naproxen 100 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: cloral hidrat, levomentol, etanol 96%, parahidroxibenzoat de etil (E214), hidroxid de sodiu, carbomeri, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
55 g
100 g

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

După prima deschidere – a se utiliza în decurs de 6 luni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel
Germania

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14110/2021/01 – ambalaj cu 1 tub a 55 g gel
14110/2021/02 – ambalaj cu 1 tub a 100 g gel

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tratamentul local al durerilor acute determinate de leziuni ale tendoanelor și ligamentelor.

Medicamentul este destinat utilizării pe termen scurt.

Instrucțiuni de utilizare: întindeți o dată aproximativ 4 cm de bandă de gel pe pielea uscată și masați ușor. Aplicați de 2-6 ori pe zi. Nu utilizați medicamentul mai mult de o săptămână.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Mobilat Pro gel

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Mobilat Pro 100 mg/g gel
naproxen

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

Tub din aluminiu

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Mobilat Pro 100 mg/g gel
naproxen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI (LOR) ACTIVE

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel
55 g
100 g

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:
După prima deschidere – a se utiliza în decurs de 6 luni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel
Germania

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14110/2021/01 – ambalaj cu 1 tub a 55 g gel
14110/2021/02 – ambalaj cu 1 tub a 100 g gel

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Tratamentul local al durerilor acute determinate de leziuni ale tendoanelor și ligamentelor.
Medicamentul este destinat utilizării pe termen scurt.

Instrucțiuni de utilizare: întindeți o dată aproximativ 4 cm de bandă de gel pe pielea uscată și masați ușor. Aplicați de 2-6 ori pe zi.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.