

Strepsils Intensiv fără zahăr 8,75 mg pastile
Flurbiprofen

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Intensiv fără zahăr 8,75 mg pastile
Flurbiprofen
{Sigla S} [de la Strepsils]

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține flurbiprofen 8,75 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține izomalț (E953), maltitol lichid (E965), macrogol 300, hidroxid de potasiu (E525), aromă de portocale, levomentol și acesulfam de potasiu (E950).

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

8 pastile
16 pastile
24 pastile
32 pastile
36 pastile

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare bucofaringiană.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11,
Sector 1, București, România

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14242/2022/01 - ambalaj cu 8 pastile
14242/2022/02 - ambalaj cu 16 pastile
14242/2022/03 - ambalaj cu 24 pastile
14242/2022/04 - ambalaj cu 32 pastile
14242/2022/05 - ambalaj cu 36 pastile

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Strepsils Intensiv pastile se utilizează pentru ameliorarea pe termen scurt a simptomelor durerii în gât.

Pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani:

Luați o pastilă la interval de 3 - 6 ore, după cum este necesar.
Schimbați întotdeauna poziția pastilei în cavitatea bucală, în timp ce se dizolvă.

Nu luați mai mult de 5 pastile într-un interval de 24 de ore.

A nu se administra mai mult de 3 zile.

A nu se administra în cazul în care:

- sunteți alergic la flurbiprofen, acid acetilsalicilic (aspirină), alte medicamente AINS (medicamente antiinflamatoare nesteroidiene) sau la oricare dintre componentele medicamentului;
- luați alte medicamente AINS sau acid acetilsalicilic cu o doză zilnică de peste 75 mg;
- ați avut insuficiență cardiacă, renală sau hepatică severă;
- aveți (sau ați avut vreodată două sau mai multe episoade de) ulcer, perforație sau sângerare la nivelul stomacului sau intestinului sau colită severă;
- ați avut vreodată probleme legate de coagularea sângelui după administrarea AINS;
- sunteți în ultimul trimestru de sarcină;
- aveți hipertensiune arterială;
- aveți durere de cap indusă de analgezice.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Strepsils Intensiv fără zahăr}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul>

Strepsils Intensiv fără zahăr 8,75 mg pastile
Flurbiprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ
BLISTER DIN PVC-PVDC/AI**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Strepsils Intensiv fără zahăr 8,75 mg pastile
Flurbiprofen

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE
PIAȚĂ**

Reckitt Benckiser (România) SRL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot :

5. ALTE INFORMAȚII

{Sigla S} [*de la Strepsils*]