

THERAFLU MAX RĂCEALĂ ȘI TUSE 1000 mg/12,2 mg/200 mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/ Clorhidrat de fenilefrină/ Guaifenezină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Theraflu Max răceală și tuse 1000 mg/12,2 mg /200 mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Clorhidrat de fenilefrină/Guaifenezină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un plic de Theraflu Max răceală și tuse conține paracetamol 1000 mg, clorhidrat de fenilefrină 12,2 mg, guaifenezină 200 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr, sodiu și aspartam (E951). Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru soluție orală.
10 plicuri.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Haleon Romania S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (Zona 2),
Sector 5, București,
România

Sigla Haleon

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14271/2022/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Theraflu Max răceală și tuse este utilizat pentru tratamentul pe termen scurt al simptomelor răcelii, gripei și al frisoanelor. Aceste simptome includ dureri ușoare și moderate, febră, congestie nazală (nas înfundat) și tuse productivă, din piept. Theraflu Max răceală și tuse are și un efect expectorant, ajutând astfel în cazul tusei productive, însoțite de eliminarea de flegmă.

Adulți, vârstnici și adolescenți cu vârsta de 16 ani și peste, cu greutatea de 50 kg și peste:

Un plic la interval de 4-6 ore, după cum este necesar, până la 3 plicuri în 24 de ore. Nu utilizați mai mult de 3 zile.

Dizolvați conținutul unui plic într-o cană (250 ml) cu apă fierbinte, însă nu clocotiți. Amestecați până la dizolvarea completă. Lăsați să se răcească până puteți bea conținutul.

Nu administrați acest medicament copiilor și adolescenților cu vârsta sub 16 ani sau adolescenților cu vârsta între 16 și 18 ani, cu greutatea mai mică de 50 kg.

A NU SE DEPĂȘI DOZA RECOMANDATĂ. Adresați-vă unui medic în cazul în care simptomele persistă mai mult de 3 zile sau dacă se agravează.

Conține paracetamol. Nu luați în același timp cu oricare alte medicamente care conțin paracetamol.

În caz de supradozaj, adresați-vă imediat medicului, chiar dacă vă simțiți bine.

Nu utilizați împreună cu niciun alt medicament pentru tratamentul tusei, răcelii sau pentru nas înfundat sau cu alcool etilic.

A nu se utiliza de către femeile gravide sau care alăptează.

Adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament dacă:

- luați alte medicamente în momentul de față,
- sunteți sub îngrijiri medicale.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Theraflu Max răceală și tuse pulbere pentru soluție orală

THERAFLU MAX RĂCEALĂ ȘI TUSE 1000 mg/12,2 mg/200 mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/ Clorhidrat de fenilefrină/ Guaifenezină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

Plic unidoză din hârtie/PEJD/Al/ionomer

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Theraflu Max răceală și tuse 1000 mg/12,2 mg /200 mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Clorhidrat de fenilefrină/Guaifenezină

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare orală

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Conține 5,16 g pulbere pentru soluție orală.

6. ALTE INFORMAȚII

Haleon Romania S.R.L.

Sigla Haleon

Theraflu Max răceală și tuse este utilizat pentru tratamentul pe termen scurt al simptomelor răcelii, gripei și al frisoanelor. Aceste simptome includ dureri ușoare și moderate, febră, congestie nazală (nas înfundat) și tuse productivă, din piept. Theraflu Max răceală și tuse are și un efect expectorant, ajutând astfel în cazul tusei productive, însoțite de eliminarea de flegmă.

Adulți, vârstnici și adolescenți cu vârsta de 16 ani și peste, cu greutatea de 50 kg și peste:

Un plic la interval de 4-6 ore, după cum este necesar, până la 3 plicuri în 24 de ore. Nu utilizați mai mult de 3 zile.

Dizolvați conținutul unui plic într-o cană (250 ml) cu apă fierbinte, însă nu clocotită. Amestecați până la dizolvarea completă. Lăsați să se răcească până puteți bea conținutul.

A nu se depăși doza recomandată.

Conține paracetamol. Nu luați în același timp cu oricare alte medicamente care conțin paracetamol.

În caz de supradozaj, adresați-vă imediat medicului, chiar dacă vă simțiți bine.

Nu utilizați împreună cu niciun alt medicament pentru tratamentul tusei, răcelii sau pentru nas înfundat sau cu alcool etilic.

A nu se utiliza de către femeile gravide sau care alăptează.

Adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament dacă:

- luați alte medicamente în momentul de față,
- sunteți sub îngrijiri medicale.