

Coldrex SinuMax Răceală și Tuse 1000 mg/200 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală
paracetamol/guaifenesină/clorhidrat de fenilefrină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Coldrex SinuMax Răceală și Tuse 1000 mg/200 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală
paracetamol/guaifenesină/clorhidrat de fenilefrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare plic cu pulbere conține: paracetamol 1000 mg, guaifenesină 200 mg și clorhidrat de fenilefrină 12,2 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sucroză, aspartam (E 951) și citrat de sodiu (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru soluție orală

5 sau 10 plicuri

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare orală

Vă rugăm să citiți cu atenție prospectul inclus, înainte să utilizați aceste plicuri.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu depășiți doza recomandată. Adresați-vă unui medic dacă simptomele persistă sau se agravează. Conține paracetamol. Nu luați în același timp niciun alt medicament care conține paracetamol. În caz de supradozaj, trebuie cerut ajutor medical imediat, chiar dacă vă simțiți bine.

Dacă luați și alte medicamente sau sunteți sub îngrijire medicală, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament. Nu utilizați împreună cu alte medicamente pentru gripă, răceală sau decongestionante.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Perrigo România S.R.L.
Str. Av. Popișteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park Clădirea 2, Unitatea 3, Etaj 4, Sector 1, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14310/2022/01 – ambalaj cu 5 plicuri
14310/2022/02 – ambalaj cu 10 plicuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru ameliorarea simptomelor de răceală și gripă și durerii și congestiei la nivelul sinusurilor, inclusiv dureri de cap, nas înfundat și dureri în gât, frisoane, pentru scăderea temperaturii precum și pentru eliminarea mucusului persistent, ajutând în acest fel la ameliorarea tusei productive.

Adulți, inclusiv vârstnici:

Un plic la interval de 4 ore, dacă este necesar. Nu luați mai mult de 4 plicuri (4 doze) într-un interval de 24 de ore. A nu se administra mai des de o dată la interval de 4 ore.

Nu se administrează copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani.

Pentru administrare orală după dizolvarea conținutului unui plic într-o cană de dimensiuni standard cu apă caldă, dar nu fierbinte (250 ml). Lăsați să se răcească până la o temperatură la care poate fi băută. Beți toată soluția în decurs de 30 minute.

16. INFORMATION IN BRAILLE

Coldrex SinuMax Răceală și Tuse

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

Coldrex SinuMax Răceală și Tuse 1000 mg/200 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală
paracetamol/guaifenesină/clorhidrat de fenilefrină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

Plic

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRAREColdrex SinuMax Răceală și Tuse 1000 mg/200 mg/12,2 mg pulbere pentru soluție orală
paracetamol/guaifenesină/clorhidrat de fenilefrină**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

Administrare orală

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Nu utilizați aceste plicuri după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5,2 g

6. ALTE INFORMAȚII

Pentru ameliorarea simptomelor de răceală și gripă și durerii și congestiei la nivelul sinusurilor, inclusiv dureri de cap, nas înfundat și dureri în gât, frisoane, pentru scăderea temperaturii, precum și pentru eliminarea mucusului persistent, ajutând în acest fel la ameliorarea tusei productive.

Cum să luați:

Pentru administrare orală după dizolvarea conținutului unui plic într-o cană de dimensiuni standard cu apă caldă, dar nu fierbinte (250 ml). Lăsați să se răcească până la o temperatură la care poate fi băută. Beți toată soluția în decurs de 30 minute.

Doze:**Adulți, inclusiv vârstnici:**

Un plic la interval de 4 ore, dacă este necesar. Nu luați mai mult de 4 plicuri (4 doze) într-un interval de 24 de ore. A nu se administra mai des de o dată la interval de 4 ore.

Nu se administrează la copiii și adolescenților cu vârsta sub 18 ani.

Vă rugăm să citiți cu atenție prospectul inclus, înainte să utilizați aceste plicuri.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

DAPP: Perrigo România S.R.L.

Str. Av. Popișteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park Cladirea 2, Unitatea 3, Etaj 4, Sector 1, București, România