

RAPLON 12,5 mg comprimate filmate
Diclofenac potasic

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

RAPLON 12,5 mg comprimate filmate
Diclofenac potasic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conține diclofenac potasic 12,5 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține: lactoză monohidrat și lecitină din soia. A se vedea prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat filmat
10 comprimate filmate
20 comprimate filmate
24 comprimate filmate
30 comprimate filmate
40 comprimate filmate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Medochemie Ltd
1-10 Constantinoupoleos street, Limassol, 3011
Cipru

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14439/2022/01 - ambalaj pentru cutie cu 10 comprimate filmate
14439/2022/02 - ambalaj pentru cutie cu 20 comprimate filmate
14439/2022/03 - ambalaj pentru cutie cu 30 comprimate filmate
14439/2022/04 - ambalaj pentru cutie cu 40 comprimate filmate
14439/2022/05 - ambalaj pentru cutie cu 24 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat fără prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Raplon este un medicament analgezic, care reduce inflamația (umflarea) și temperatura corpului. Se utilizează în tratarea durerilor reumatice, musculare, durerilor de cap, dureri de dinți, dureri menstruale, durere acută inferioară a spatelui, durere și febră asociată cu gripa, durere în gât și răceală. Instrucțiuni de utilizare: Înghițiți comprimatele întregi cu apă, de preferință înainte de mese. Adulți și adolescenți cu vârsta de 14 ani și peste: Luați o doză inițială de 2 comprimate atunci când apar simptome. Dacă este necesar, continuați cu 1 comprimat la fiecare 4-6 ore. Nu luați mai mult de 6 comprimate în 24 de ore. Nu depășiți doza recomandată.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

RAPLON 12,5 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

RAPLON 12,5 mg comprimate filmate
Diclofenac potasic

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

RAPLON 12,5 mg comprimate filmate
Diclofenac potasic

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

MEDOCHEMIE LTD

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII

Nu este cazul