

Faringosept Vanilie 10 mg comprimate de supt
ambazonă monohidrat**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Faringosept Vanilie 10 mg comprimate de supt
ambazonă monohidrat

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat de supt conține ambazonă monohidrat 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sucroză (zahăr) și lactoză monohidrat (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate de supt
10 comprimate de supt
20 comprimate de supt

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare bucofaringiană.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi ferit de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Terapia S.A.
Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca, România
Sigla companiei

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14492/2022/01- ambalaj cu 10 comprimate de supt
14492/2022/02- ambalaj cu 20 comprimate de supt

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Se utilizează la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 14 ani ca adjuvant în infecții acute cu poartă de intrare sau localizare la nivelul cavității bucale și faringelui (gingivite, faringite, amigdalite) și postamigdalectomie (îndepărtarea amigdalelor pe cale chirurgicală). Comprimatele nu se înghit, ci se lasă să se dizolve lent în cavitatea bucală.

Doza uzuală la adulți este de 3 - 5 comprimate pe zi, timp de 3 - 4 zile, la adolescenți și copii cu vârsta peste 14 ani este de 1 comprimat de 3 ori pe zi, timp de 3 - 4 zile. Se administrează imediat după mese (la 15-30 minute). Se recomandă ca timp de 2-3 ore după administrare să se evite consumul de alimente sau lichide. Nu depășiți doza recomandată. Dacă simptomele persistă, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Faringosept Vanilie 10 mg

Faringosept Vanilie 10 mg comprimate de supt
ambazonă monohidrat

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER DIN PVC-PE-PVdC/Al

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Faringosept Vanilie 10 mg comprimate de supt
ambazonă monohidrat

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Sigla companiei

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII