

PADUDEN Rapid Forte 400 mg comprimate filmate
Ibuprofen sub formă de ibuprofen lizinat**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie de carton**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

PADUDEN Rapid Forte 400 mg comprimate filmate
Ibuprofen sub formă de ibuprofen lizinat

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conține ibuprofen 400 mg (echivalent cu ibuprofen lizinat 684 mg).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat filmat

10 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP.:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Terapia SA
Str. Fabricii nr.124
Cluj-Napoca, România
{Sigla Terapia - a SUN PHARMA company}
{Sigla SUN PHARMA}

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

<Cutie cu blistere din PVC-PVDC/Al>
14594/2022/01 – ambalaj cu 10 comprimate filmate
<Cutie cu blistere din PVC-PVDC/Al cu sistem de închidere securizat pentru copii>
14594/2022/02 – ambalaj cu 10 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PADUDEN Rapid Forte este utilizat pentru tratamentul simptomatic pe termen scurt al durerii ușoare până la moderate cum sunt dureri de cap, migrene, dureri dentare, dismenoree, dureri musculare, dureri dorsale, dureri reumatice, febră și febrilitate și simptome de răceală și gripă.

Doze:

Numai pentru administrare orală și pe termen scurt.

Luați doza cea mai mică pentru cea mai scurtă perioadă de timp necesară ameliorării simptomelor. Se utilizează la adulți și adolescenți cu greutatea peste 40 kg (cu vârsta de 12 ani și peste): Luați 1 comprimat, cu apă, de cel mult trei ori pe zi, după cum este necesar. Lăsați un interval de cel puțin șase ore între doze.

Nu luați mai mult de 3 comprimate (1200 mg ibuprofen) în 24 de ore.

Nu administrați acest medicament la adolescenți cu greutatea sub 40 kg și la copii cu vârsta sub 12 ani.

Dacă la copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani acest medicament este necesar mai mult de 3 zile sau dacă simptomele se agravează, trebuie consultat medicul.

La adulți trebuie consultat medicul dacă simptomele persistă sau se agravează sau dacă utilizarea acestui medicament este necesară mai mult de 5 zile pentru tratarea durerii și mai mult de 3 zile pentru tratarea migrenei sau febrei.

Atenționare: Nu luați o doză mai mare de medicament decât cea recomandată pe ambalaj.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

paduden rapid forte 400 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

PADUDEN Rapid Forte 400 mg comprimate filmate
Ibuprofen sub formă de ibuprofen lizinat

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister din PVC-PVDC/Al/; Blister din PVC-PVDC/Al cu sistem de închidere securizat pentru copii

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PADUDEN Rapid Forte 400 mg comprimate filmate
Ibuprofen sub formă de ibuprofen lizinat

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Terapia SA
{ Sigla Terapia - a SUN PHARMA company }

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII