

**TANTUMGRIP cu gust de lămâie și miere 600 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală în plic**  
Paracetamol/clorhidrat de fenilefrină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**CUTIE**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

TANTUMGRIP cu gust de lămâie și miere 600 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală în plic  
paracetamol / clorhidrat de fenilefrină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține: paracetamol 600 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg (corespunzând la 8,2 mg fenilefrină).

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Excipienți: sucroză, sodiu

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală în plic.

10 plicuri.

16 plicuri.

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Nu luați împreună cu alte medicamente pentru răceală și gripă și decongestionante.

CONȚINE PARACETAMOL. Nu depășiți doza indicată. Dozele mai mari decât cele recomandate pot provoca afecțiuni hepatice grave.

Nu luați niciun fel de alt medicament care conține paracetamol.

Nu luați acest medicament fără recomandarea medicului dumneavoastră dacă suferiți de boală hepatică sau dacă aveți probleme cu consumul de alcool.

#### **8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

#### **9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate și lumină.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

Orice medicamente neutilizate sau materiale reziduale nu trebuie aruncate în mediul înconjurător.

Aruncați în containere adecvate pentru eliminarea medicamentelor.

#### **11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Angelini Pharma Österreich GmbH  
Brigittenauer Lände 50-54  
1200 Viena  
Austria

#### **12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

14628/2022/01- ambalaj cu 10 plicuri

14628/2022/02- ambalaj cu 16 plicuri

#### **13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

#### **14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

#### **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

##### **Indicații**

Pentru ameliorarea simptomelor asociate cu răceală și gripă, incluzând ameliorarea durerii ușoare până la moderată, a durerii în gât, a durerii de cap, a nasului înfundat și febrei.

Utilizați acest medicament numai dacă simptomele de gripă sau de răceală sunt însoțite de nas înfundat.

**Doze**

*Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani cu o greutate corporală peste 40 kg:* 1 plic de până la 4 ori pe zi, după caz. Lăsați un interval de cel puțin 4-6 ore între doze. Nu luați mai mult de 4 plicuri într-un interval de 24 ore.

Dizolvați conținutul unui plic într-un pahar cu apă caldă sau rece (aproximativ 150 ml) și beți soluția.

**Nu utilizați TANTUMGRIP mai mult de 5 zile.**

<b>16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE</b>
----------------------------------

TANTUMGRIP cu gust de lămâie și miere

<b>17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL</b>
---

Nu este cazul.

<b>18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE</b>
---

Nu este cazul.

**TANTUMGRIP cu gust de lămâie și miere 600 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală în plic**  
Paracetamol/clorhidrat de fenilefrină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

Plic

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

TANTUMGRIP cu gust de lămâie și miere 600 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală în plic paracetamol / clorhidrat de fenilefrină

Administrare orală.

**2. METODE DE ADMINISTRARE**

Dizolvați conținutul unui plic într-un pahar cu apă caldă sau rece (aproximativ 150 ml) și beți soluția.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. CONȚINUT DUPĂ GREUTATE, VOLUM SAU UNITATE**Fiecare plic de 4,1 g conține substanțele active: paracetamol 600 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg. De asemenea, conține: sucroză și sodiu (vezi prospectul pentru informații suplimentare).**6. ALTE INFORMAȚII****Indicații:**

Pentru ameliorarea simptomelor asociate cu răceală și gripă, incluzând ameliorarea durerii ușoare până la moderată, a durerii în gât, a durerii de cap, a nasului înfundat și febrei.

Utilizați acest medicament numai dacă simptomele de gripă sau de răceală sunt însoțite de nas înfundat.

TANTUMGRIP este destinat adulților și adolescenților cu vârsta peste 12 ani și cu o greutate corporală peste 40 kg.

**A se citi prospectul înainte de utilizare.****A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.**