

**TANTUMGRIP cu gust de portocală 600 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală în plic**  
Paracetamol/clorhidrat de fenilefrină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

TANTUMGRIP cu gust de portocală 600 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală în plic  
paracetamol / clorhidrat de fenilefrină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic conține: paracetamol 600 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg (corespunzând la 8,2 mg fenilefrină).

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Excipienți: sucroză, sodiu, glucoză

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru soluție orală în plic.

10 plicuri.

16 plicuri.

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Nu luați împreună cu alte medicamente pentru răceală și gripă și decongestionante.

CONȚINE PARACETAMOL. Nu depășiți doza indicată. Dozele mai mari decât cele recomandate pot provoca afecțiuni hepatice grave.  
Nu luați niciun fel de alt medicament care conține paracetamol.

#### **8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

#### **9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C.  
A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate și lumină.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

#### **11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Angelini Pharma Österreich GmbH  
Brigittenauer Lände 50-54  
1200 Viena  
Austria

#### **12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

14629/2022/01- ambalaj cu 10 plicuri  
14629/2022/02- ambalaj cu 16 plicuri

#### **13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

#### **14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

#### **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

##### **Indicații**

Pentru ameliorarea simptomelor asociate cu răceala și gripa, incluzând ameliorarea durerii ușoare până la moderată, a durerii în gât, a durerii de cap, a nasului înfundat și febrei.  
Utilizați acest medicament numai dacă simptomele de gripă sau de răceală sunt însoțite de nas înfundat.

TANTUMGRIP este destinat adulților și adolescenților cu vârsta peste 12 ani.

**Doze**

*Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani:* 1 plic la interval de 4-6 ore. Nu luați mai mult de 4 plicuri într-un interval de 24 ore.

Dizolvați conținutul unui plic într-un pahar cu apă caldă sau rece (aproximativ 150 ml) și beți soluția.

**Nu utilizați TANTUMGRIP mai mult de 5 zile. A se citi prospectul înainte de utilizare.**

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

TANTUMGRIP cu gust de portocală

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**TANTUMGRIP cu gust de portocală 600 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală în plic**  
Paracetamol / clorhidrat de fenilefrină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI****Plic****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**TANTUMGRIP cu gust de portocală 600 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală în plic  
paracetamol / clorhidrat de fenilefrină

Administrare orală.

**2. METODE DE ADMINISTRARE**

Dizolvați conținutul unui plic într-un pahar cu apă caldă sau rece (aproximativ 150 ml) și beți soluția.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. CONȚINUT DUPĂ GREUTATE, VOLUM SAU UNITATE**Fiecare plic de 4,1 g conține substanțele active: paracetamol 600 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg.  
De asemenea, conține: sucroză, sodiu și glucoză (vezi prospectul pentru informații suplimentare).**6. ALTE INFORMAȚII****Indicații:**

Pentru ameliorarea simptomelor asociate cu răceala și gripa, incluzând ameliorarea durerii ușoare până la moderată, a durerii în gât, a durerii de cap, a nasului înfundat și febrei.

Utilizați acest medicament numai dacă simptomele de gripă sau de răceală sunt însoțite de nas înfundat.

TANTUMGRIP este destinat adulților și adolescenților cu vârsta peste 12 ani.

**A se citi prospectul înainte de utilizare. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.**