

Microlax soluție rectală

Sorbitol lichid (cristalizabil), citrat de sodiu, lauril sulfoacetat de sodiu 70%

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Microlax soluție rectală

Sorbitol lichid (cristalizabil), citrat de sodiu, lauril sulfoacetat de sodiu 70%

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Sorbitol lichid (cristalizabil)4,4650 g

Citrat de sodiu0,4500 g

Lauril sulfoacetat de sodiu 70% 0,0645 g

Per 5 ml de soluție rectală

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Acid sorbic, glicerină și apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție rectală (clismă) într-un recipient unidoză de 5 ml.

Ambalaje cu 4, 6, 12 sau 50 de recipiente unidoză.

5. MOD ȘI CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare rectală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ (E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE (SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght, Dublin 24, Irlanda

12. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14656/2022/01 – ambalaj cu 4 recipiente unidoză
14656/2022/02 – ambalaj cu 6 recipiente unidoză
14656/2022/03 – ambalaj cu 12 recipiente unidoză
14656/2022/04 – ambalaj cu 50 recipiente unidoză

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Microlax soluție rectală se utilizează pentru tratarea constipației ocazionale.
Adulți: 1 tub cu aplicator pe zi.

Rupeți vârful. Lubrifiați aplicatorul cu ajutorul conținutului, pentru a facilita inserarea.
Introduceți aplicatorul în rect și goliți conținutul tubului prin apăsare; retrageți recipientul, fără a elibera presiunea de pe tub.
Are efect în 5-20 de minute

Solicitați o consultație medicală dacă simptomele persistă mai mult de câteva zile și evitați utilizarea pe termen lung. Tratamentul medical al constipației reprezintă numai o măsură suplimentară unui stil de viață sănătos:

- consum crescut de fibre vegetale și lichide;
- recomandări privind activitatea fizică și antrenarea tranzitului intestinal.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Microlax

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

<Nu este cazul>

Microlax soluție rectală

Sorbitol lichid (cristalizabil), citrat de sodiu, lauril sulfoacetat de sodiu 70%

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Recipient unidoză de 5 ml

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI ȘI CALEA/CĂILE DE ADMINISTRARE

Microlax soluție rectală
Sorbitol lichid (cristalizabil), citrat de sodiu, lauril sulfoacetat de sodiu 70%
Administrare rectală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUT PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 ml

6. ALTE INFORMAȚII