

Fervex durere și febră 500 mg comprimate efervescente  
paracetamol

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**CUTIE**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Fervex durere și febră 500 mg comprimate efervescente  
paracetamol

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat efervescent conține paracetamol 500 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Excipienți cu efect cunoscut: benzoat de sodiu (E211), sodiu și sorbitol (E420).

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimat efervescent  
16 comprimate efervescente

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Conținut ridicat de sodiu - vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

#### **9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

#### **11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

UPSA SAS  
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Franța

#### **12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

1756/2009/01

#### **13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie

#### **14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

#### **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

##### **Durere și febră**

Fervex durere și febră este indicat în tratamentul simptomatic al durerilor de intensitate ușoară până la moderată, cu diferite localizări (dureri de cap, dureri de dinți, dureri ale mușchilor sau articulațiilor sau în caz de menstruație dureroasă) și tratamentul simptomatic al febrei.

A nu se depăși doza recomandată.

Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 5 zile în cazul tratării durerilor articulare, 3 zile în cazul febrei și 2 zile în cazul durerilor în gât însoțite sau urmate de febră, dureri de cap, erupții trecătoare pe piele, greață, sau vărsături.

Nu se recomandă la copii cu vârsta sub 4 ani sau cu greutatea corporală sub 14 kg. Pentru aceștia sunt disponibile alte forme de prezentare care conțin paracetamol.

A nu se lua împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol sau clorhidrat de propacetamol.

#### **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

fFervex durere și febră 500 mg

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul

Fervex durere și febră 500 mg comprimate efervescente  
pParacetamol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**BLISTER**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Fervex durere și febră 500 mg comprimate efervescente  
paracetamol

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

{UPSA SAS}

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie

**5. ALTE INFORMAȚII**