

Ambroxol AL 15 mg/5 ml, sirop
Clorhidrat de ambroxol**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL PRIMAR****CUTIE ȘI ETICHETĂ DE FLACON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Ambroxol AL 15 mg/5 ml, sirop
Clorhidrat de ambroxol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

5 ml sirop conțin 15 mg clorhidrat de ambroxol.
2,5 ml sirop conțin 7,5 mg clorhidrat de ambroxol.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sorbitol lichid (necristalizabil), para-hidroxibenzoat de metil, para-hidroxibenzoat de propil (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Sirop

{Cutie}

Un flacon a 100 ml sirop și o măsură dozatoare, gradată la 2,5, 5, 10 și 15 ml

Un flacon a 250 ml sirop și o măsură dozatoare, gradată la 2,5, 5, 10 și 15 ml

{Eticheta de flacon}

100 ml

250 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se utiliza în maxim 12 luni după prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

ALIUD PHARMA GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 19, 89150 Laichingen, Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

1905/2009/01 – ambalajul cu 100 ml sirop

1905/2009/02 – ambalajul cu 250 ml sirop

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru ce se utilizează Ambroxol AL:

Ambroxol AL este un medicament care elimină mucusul, fiind utilizat în boli pulmonare și ale bronhiilor în care se formează mucus vâscos.

Cum să utilizați Ambroxol AL:

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 – 12 ani: 5 ml sirop (15 mg clorhidrat de ambroxol) de 2 –3 ori pe zi, în funcție de gravitatea afecțiunii.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 – 6 ani: 2,5 ml sirop (7,5 mg clorhidrat de ambroxol) de 3 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 1 – 2 ani: 2,5 ml sirop (7,5 mg clorhidrat de ambroxol) de 2 ori pe zi.

Adulți și adolescenți: 10 ml sirop (30 mg clorhidrat de ambroxol) de 3 ori pe zi în primele 2-3 zile, ulterior 10 ml sirop (30 mg clorhidrat de ambroxol) de 2 ori pe zi.

Pentru adulți, la nevoie dozele pot fi crescute până la 20 ml sirop (60 mg clorhidrat de ambroxol) de 2 ori pe zi.

Ambroxol Al 15 mg/5 ml trebuie administrat în timpul meselor.

Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 4 - 5 zile.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Ambroxol AL 15 mg/5 ml} - numai pentru cutie

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

Nu este cazul.