

**DULCOLAX 5 mg drajeuri gastrorezistente**  
Bisacodil

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**CUTIE**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

DULCOLAX 5 mg drajeuri gastrorezistente  
Bisacodil

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un drajeu gastrorezistent conține bisacodil 5 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și lactoză, respectiv zahăr și ulei de ricin. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Drajeu gastrorezistent  
30 drajeuri gastrorezistente

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

OPELLA HEALTHCARE ROMANIA SRL  
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajul 9  
Sector 2, București, România

{sigla Sanofi}

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

1956/2009/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Dulcolax se utilizează:

- la pacienți cu constipație
- pentru pregătirea investigațiilor medicale, înainte și după operații și afecțiuni care necesită facilitarea evacuării materiilor fecale.

Adulți și copii cu vârsta peste 10 ani :

1-2 drajeuri gastrorezistente Dulcolax 5 mg (5 - 10 mg bisacodil) pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 10 ani:

1 drajeu gastrorezistent Dulcolax 5 mg (5 mg bisacodil) pe zi .

Doza maximă zilnică nu trebuie depășită.

Copii cu vârsta de 10 ani sau mai mici, care suferă de constipație cronică sau persistentă, trebuie tratați numai conform indicațiilor medicului.

Drajeurile trebuie luate seara pentru a avea activitate intestinală în dimineața următoare. Acestea trebuie înghițite întregi, cu o cantitate adecvată de lichid (dar nu lapte).

Efectul laxativ la 6-12 ore după administrare.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

{DULCOLAX 5 mg}

**DULCOLAX 5 mg drajeuri gastrorezistente**  
Bisacodil

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**  
Blister din PVC-PVDC/Al

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

DULCOLAX 5 mg drajeuri gastrorezistente  
Bisacodil

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIATĂ**

{sigla Sanofi}

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie

**5. ALTE INFORMAȚII**