

VIBROCIL DUO 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină/bromură de ipratropiu**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie (Pompă acționată vertical cu două degete)****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**VIBROCIL DUO 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină/bromură de ipratropiu**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**1 ml conține: clorhidrat de xilometazolină 0,5 mg, bromură de ipratropiu 0,6 mg
1 puf conține clorhidrat de xilometazolină 70 micrograme și bromură de ipratropiu 84 micrograme**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Edetat disodic dihidrat, glicerol 85%, apă purificată, acid clorhidric concentrat și hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTULSpray nazal, soluție
10 ml**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare nazală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

După prima deschidere a flaconului, spray-ul nazal poate fi utilizat până la sfârșitul termenului de valabilitate a medicamentului.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Haleon România S.R.L.

Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (ZONA 2), Sector 5, București, România

Sigla Haleon

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

4350/2012/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Desfundă nasul. Reduce secreția nazală.

Doze:

Adulți (cu vârsta peste 18 ani):

Un puf în fiecare nară de cel mult 3 ori pe zi, maximum 7 zile.

Între administrarea a două doze trebuie să treacă cel puțin 6 ore.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Vibrociil Duo

VIBROCIL DUO 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină/bromură de ipratropiu**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie (Pompă acționată lateral cu degetul mare)****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**VIBROCIL DUO 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml spray nazal, soluție
Clorhidrat de xilometazolină/bromură de ipratropiu**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**1 ml conține: clorhidrat de xilometazolină 0,5 mg, bromură de ipratropiu 0,6 mg
1 puf conține clorhidrat de xilometazolină 70 micrograme și bromură de ipratropiu 84 micrograme**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Edetat disodic dihidrat, glicerol 85%, apă purificată, acid clorhidric concentrat și hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTULSpray nazal, soluție
10 ml**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare nazală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

După prima deschidere a flaconului, spray-ul nazal poate fi utilizat până la sfârșitul termenului de valabilitate a medicamentului.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Haleon România S.R.L.

Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One, Etaj 6 (ZONA 2), Sector 5, București, România

Sigla Haleon

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

4350/2012/02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Desfundă nasul. Reduce secreția nazală.

Doze:

Adulți (cu vârsta peste 18 ani):

Un puf în fiecare nară de cel mult 3 ori pe zi, maximum 7 zile.

Între administrarea a două doze trebuie să treacă cel puțin 6 ore.



16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Vibrocil Duo

VIBROCIL DUO 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml spray nazal, soluție
clorhidrat de xilometazolină/bromură de ipratropiu

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
ETICHETA FLACONULUI**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

VIBROCIL DUO 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml spray nazal, soluție
clorhidrat de xilometazolină/bromură de ipratropiu

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare nazală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:
După prima deschidere a flaconului, spray-ul nazal poate fi utilizat până la sfârșitul termenului de valabilitate a medicamentului.

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml

6. ALTE INFORMAȚII

Haleon România S.R.L.

Desfundă nasul. Reduce secreția nazală.

Sigla Haleon