

CALCIU-SANDOZ FORTE 500 mg,comprimate efervescente
Carbonat de calciu/gluconolactat de calciu

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

CALCIU-SANDOZ FORTE 500 mg,comprimate efervescente
Carbonat de calciu/gluconolactat de calciu

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un comprimat efervescent conține calciu 0,5 g, sub formă de carbonat de calciu 0,3 g și gluconolactat de calciu 2,94 g.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sodiu, sorbitol, glucoză. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat efervescent
10 comprimate efervescente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

SANDOZ PHARMACEUTICALS S.R.L.
Calea Floreasca, nr. 169 A, Clădirea A
Etaj 1, Sector 1, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

5843/2005/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZAREPentru ce se utilizează

Tratamentul deficitului de calciu.

Tratament profilactic atunci când necesarul de calciu este crescut (perioada de creștere, sarcină, alăptare).

Tratamentul adjuvant al osteoporozei de diferite cauze (post-menopauză, de vârstă, determinată de corticosteroizi, post gastrectomie sau imobilizare).

Cum se utilizează

Comprimatele efervescente trebuie dizolvate într-un pahar cu apă.

Adulți, adolescenți și copii cu vârsta cuprinsă între 10 ani - 12 ani: 2 comprimate efervescente CALCIU-SANDOZ FORTE 500 mg pe zi.

Copii:

- copii cu vârsta cuprinsă între 6 ani - 10 ani: un comprimat efervescent CALCIU-SANDOZ FORTE 500 mg pe zi.

Închideți bine tubul după utilizarea unui comprimat.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{CALCIU-SANDOZ FORTE 500 mg}

CALCIU-SANDOZ FORTE 500 mg, comprimate efervescente
Carbonat de calciu/gluconolactat de calciu

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

TUB din PP

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

CALCIU-SANDOZ FORTE 500 mg, comprimate efervescente
Carbonat de calciu/gluconolactat de calciu
orală

2. MOD DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 comprimate efervescente

6. ALTE INFORMAȚII

<sigla Sandoz>