

**Exoderil 10 mg/g cremă**

Clorhidrat de naftifină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**CUTIE**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Exoderil 10 mg/g cremă

Clorhidrat de naftifină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un gram cremă conține clorhidrat de naftifină 10 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Hidroxid de sodiu, alcool benzilic, sorbitan stearat, cetilpalmitat, alcool cetilic, alcool stearic, polisorbitat 60, isopropil miristat, apă purificată.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Cremă

Un tub a 15 g cremă

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Conține și alcool cetilic (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**Sandoz GmbH  
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria

{Sigla SANDOZ}

**12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

6009/2013/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****Cum să utilizați Exoderil cremă**

Exoderil se utilizează o dată pe zi, în strat subțire, pe zona de piele afectată (în prealabil curățată și uscată) și se masează ușor.

Pentru a preveni reapariția manifestărilor (mâncărime, arsuri), tratamentul trebuie continuat 2 săptămâni după vindecarea clinică.

Înainte sau în timpul tratamentului infecțiilor unghiilor, unghia afectată trebuie tăiată cât de scurt posibil și suprafața ei protejată. Infecțiile fungice ale unghiilor trebuie tratate mai multe luni, până când o altă unghie a crescut.

**Pentru ce se utilizează Exoderil cremă**

Pentru orice grupă de vârstă:

- infecții micotice cutanate sau ale pliurilor cutanate (tinea corporis, tinea inghinalis)

- infecții micotice ale piciorului, în special la nivel interdigital, la nivelul tălpii și la nivelul unghiilor (onicomicoze)
- infecții micotice ale mâinii, localizate la nivel interdigital și la nivelul unghiilor (onicomicoze)
- infecții cutanate cu Candida
- pitiriasis versicolor
- dermatomicoze inflamatorii (cu sau fără mâncărime).

Antimicotic, antibacterian, antiinflamator

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

EXODERIL 10 mg/g CREMĂ

**Exoderil 10 mg/g cremă**

Clorhidrat de naftifină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**TUB din Al**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Exoderil 10 mg/g cremă

Clorhidrat de naftifină

**2. MOD DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

15 g cremă

**6. ALTE INFORMAȚII**

Sandoz GmbH  
{Sigla SANDOZ}

Antimicotic, antibacterian, antiinflamator