

Exoderil 10 mg/ml soluție cutanată

Clorhidrat de naftifină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Exoderil 10 mg/ml, soluție cutanată
Clorhidrat de naftifină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un mililitru soluție cutanată conține clorhidrat de naftifină 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Propilenglicol, etanol, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluție cutanată
Un flacon a 10 ml soluție cutanată
Un flacon a 20 ml soluție cutanată

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria

{Sigla SANDOZ}

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

6010/2013/01

6010/2013/02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cum să utilizați Exoderil soluție cutanată

Exoderil trebuie aplicat o dată pe zi, pe zona cutanată afectată, după curățarea și uscarea în prealabil a acestei zone.

Pentru a preveni reapariția manifestărilor, tratamentul trebuie continuat 2 săptămâni după vindecarea clinică.

Pentru ce se utilizează Exoderil soluție cutanată

Pentru orice grupă de vârstă:

- infecții micotice cutanate sau ale pliurilor cutanate (tinea corporis, tinea inghinalis)
- infecții micotice ale piciorului, în special la nivel interdigital, la nivelul tălpii și la nivelul unghiilor (onicomicoze)
- infecții micotice ale mâinii, localizate la nivel interdigital și la nivelul unghiilor (onicomicoze)

- infecții cutanate cu Candida
- pitiriasis versicolor
- dermatomicoze inflamatorii (cu sau fără mâncărime).

Antimicotic, antibacterian, antiinflamator

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

EXODERIL 10 mg/ml

Exoderil 10 mg/ml soluție cutanată
Clorhidrat de naftifină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta de flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Exoderil 10 mg/ml soluție cutanată
Clorhidrat de naftifină

2. MOD DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml

6. ALTE INFORMAȚII

Sandoz GmbH
{Sigla SANDOZ}

Antimicotic, antibacterian, antiinflamator