

Rompirin E 100 mg comprimate gastrorezistente

Acid acetilsalicilic

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Rompirin E 100 mg comprimate gastrorezistente

Acid acetilsalicilic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat gastrorezistent conține acid acetilsalicilic 100 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat gastrorezistent

20 comprimate gastrorezistente

30 comprimate gastrorezistente

1500 comprimate gastrorezistente

5. MODUL ȘI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE (SUNT) NECESARĂ(E)

Ambalaj de uz spitalicesc (pentru ambalajul de 1500 comprimate gastrorezistente)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Antibiotice SA
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iași, România

Logo Antibiotice 

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

6267/2014/01 - ambalaj de 20 comprimate gastrorezistente
6267/2014/02 - ambalaj de 30 comprimate gastrorezistente
6267/2014/03 - ambalaj de 1500 comprimate gastrorezistente, ambalaj de uz spitalicesc

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Rompirin E reduce vâscozitatea și coagulabilitatea sângelui fiind indicat în angina pectorală instabilă, infarctul miocardic acut și profilaxia secundară a infarctului miocardic.

Doza recomandată în afecțiunile cardiovasculare este de 100 – 300 mg acid acetilsalicilic pe zi, administrat fracționat. Comprimatele se înghit întregi, cu o cantitate suficientă de apă.

Nu utilizați Rompirin E

- Dacă sunteți alergic la acid acetilsalicilic, la orice alt antiinflamator sau la oricare dintre celelalte componente ale Rompirin E;
- Dacă suferiți de diverse afecțiuni hemoragice (cum ar fi hemofilie sau trombocitopenie);
- Dacă aveți ulcer gastric sau duodenal în evoluție;
- Dacă aveți insuficiență hepatică sau renală severă;
- Dacă sunteți însărcinată în ultimul trimestru de sarcină.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Rompirin E 100 mg

Rompirin E 100 mg comprimate gastrorezistente
Acid acetilsalicilic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Rompirin E 100 mg comprimate gastrorezistente
Acid acetilsalicilic

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Antibiotice logo



3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. ALTE INFORMAȚII