

Strepsils Lemon fără zahăr pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4-diclorbenzilic**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Lemon fără zahăr pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4-diclorbenzilic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4-diclorbenzilic 1,2 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține maltitol lichid (E 965), izomalt (E 953), acid tartric, aromă de lămâie (conține alcool benzilic, citral, citronelol, d-limonen, geraniol și linalool), zaharină sodică (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pastilă
8 pastile
16 pastile
24 pastile
36 pastile

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare bucofaringiană.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11
Sectorul 1, București, România

{Sigla Reckitt}

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

6526/2014/01 – {pentru ambalajul cu 1 blister cu 8 pastile}
6526/2014/02 – {pentru ambalajul cu 2 blistere a câte 8 pastile}
6526/2014/03 – {pentru ambalajul cu 2 blistere a câte 12 pastile}
6526/2014/04 – {pentru ambalajul cu 3 blistere a câte 12 pastile}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Strepsils Lemon fără zahăr aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.
Strepsils Lemon fără zahăr se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.
Medicament antiseptic pentru calmarea durerilor în gât.
Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.
Efect antibacterian, antifungic și antiviral

Mod de administrare:

Adulți și copii cu vârsta peste 6 ani

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Lemon fără zahăr la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un interval de 24 de ore; pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile.

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Strepsils Lemon fără zahăr}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

Strepsils Lemon fără zahăr pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4-diclorbenzilic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ
BLISTER DIN PVC-PVdC/Al**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Strepsils Lemon fără zahăr pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4-diclorbenzilic

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII

{Sigla S de la Strepsils }