

Strepsils Plus pastile
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic/clorhidrat de lidocaină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Strepsils Plus pastile
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic/clorhidrat de lidocaină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg, alcool 2,4 diclorbenzilic 1,2 mg și clorhidrat de lidocaină 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și zahăr și glucoză (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pastilă
1 x 12 pastile
2 x 8 pastile
3 x 8 pastile

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare bucofaringiană.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11
Sectorul 1, București, România
{Logo Strepsils}

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

7022/2014/01 – { 1 x 12 pastile}
7022/2014/02 – { 2 x 8 pastile}
7022/2014/03 – { 3 x 8 pastile}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Calmare rapidă și de lungă durată a durerii puternice în gât.

- anesteziec local puternic
- antibacterian
- antiviral
- antifungic

Pentru ce se administrează?

Pastilele Strepsils Plus sunt create special pentru a ameliora rapid și eficace durerile faringiene puternice. Ele conțin un anesteziec local puternic care calmează rapid durerea și două antiseptice cu acțiune împotriva unei game largi de bacterii care provoacă dureri faringiene și infecții bucale.

Conține 2 agenți antibacterieni plus un anesteziec local puternic.

Efect antibacterian, antifungic și antiviral

Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii puternice în gât.

Reduce dificultățile la înghițire

Cum îl veți folosi?

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: se administrează o pastilă Strepsils Plus la fiecare 2 ore, atât timp cât durerea persistă; pastila se dizolvă lent în gură.

Nu se administrează mai mult de 8 pastile în 24 ore.

Nu utilizați acest medicament dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele medicamentului, dacă suferiți de astm bronșic sau bronhospasm, dacă aveți sau prezentați risc de methemoglobinemie.

Precauții

Nu depășiți doza recomandată.

Medicamentul nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 12 ani.

Dacă simptomele persistă, sunt însoțite de febră mare, dureri de cap sau dacă apar și alte manifestări neplăcute, anunțați medicul.

Dacă sunteți însărcinată sau alăptați cereți sfatul medicului înainte de a utiliza acest medicament.

Care sunt reacțiile adverse care pot să apară?

Ocazional, pot să apară reacții alergice.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{Strepsils Plus}

Strepsils Plus pastile
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzilic/clorhidrat de lidocaină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ
BLISTER DIN PVC-PVDC/AI**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Strepsils Plus pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4 diclorbenzilic/Clorhidrat de lidocaină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII

{Logo Strepsils}