

TRACHISAN - COMPRIMATE DE SUPT
clorhidrat de lidocaină, digluconat de clorhexidină, tirotricină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Trachisan - comprimate de supt
tirotricină, clorhidrat de lidocaină, digluconat de clorhexidină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un comprimat de supt conține tirotricină 0,5 mg, clorhidrat de lidocaină 1,0 mg și digluconat de clorhexidină 1,0 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sorbitol. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat de supt
20 comprimate de supt

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare: orală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Un comprimat de supt conține 0,69 g sorbitol, corespunzător la 0,057 unități glucidice (unități de pâine).
Administrarea acestui medicament necesită precauție la pacienții diabetici.

Atenționare pentru sportivi - Trachisan - comprimate de supt conține ca substanță activă și un anesteziec local (clorhidratul de lidocaină) care poate determina o reacție fals pozitivă la testele antidoping.

8. DATA DE EXPIRARE

Exp:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Germania

{Sigla ENGELHARD Arzneimittel}
{Sigla VEDRA INTERNATIONAL}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

7382/2015/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicații:

Inflamații și infecții ale cavităților orală și faringiană (inflamația mucoasei bucale, inflamația gingiilor și amigdalite). Infecții ale căilor respiratorii superioare, dureri în gât, dificultate la înghițire.

Doze și mod de administrare:

Lăsați un comprimat de supt să se dizolve lent în gură, la fiecare două ore; se administrează până la 8 comprimate de supt pe zi la adulți și adolescenți și până la 6 comprimate de supt pe zi la copii între 4 – 12 ani.

Copiilor cu vârsta sub 4 ani nu li se administrează Trachisan- comprimate de supt.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Trachisan

TRACHISAN - COMPRIMATE DE SUPT
clorhidrat de lidocaină, digluconat de clorhexidină, tirotricină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Trachisan - comprimate de supt
tirotricină, clorhidrat de lidocaină, digluconat de clorhexidină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Germania

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII